



平成26年11月17日付で
登録内容が変更になりました。

※ジェイエース剤をご使用の際は、
以前にご購入された製品に
つきましても、登録内容を
ご確認のうえご使用
ください。



ジェイエース粒剤

農薬登録の削除作物について

ジェイエース粒剤では、
下表①の登録作物が削除されました。

下表①の作物ではジェイエース粒剤の
使用をしないでください。

■表① ジェイエース粒剤（登録番号 第20939号）
平成26年11月17日 登録変更後（作物削除）

作物名 **ミニトマト**

全農

登録商標 第4702318号

使用方法が変更となった作物

キャベツ・はくさい・ブロッコリー・だいこん・かぶ・なばな・きゅうり・トマト・なす
みずな・ばれいしょ・こまつな・チンゲンサイ

ジェイエース粒剤では、下表②の登録が変更になりました。

今後は、下表②の使用方法のとおりジェイエース粒剤を使用してください。

■表② ジェイエース粒剤（登録番号 第20939号）平成26年11月17日 登録変更後（変更作物は 部分、変更は赤字部分）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ	3～6kg/10a (1株当たり1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
はくさい	アブラムシ類	6kg/10a(1株当たり2g)			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ		3～4kg/10a	は種前	1回	作条散布
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	4kg/10a				収穫21日前まで
かぶ	アブラムシ類		6kg/10a(1株当たり2g)	定植時	土壌混和処理	
なばな	アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり1～2g)			定植時	1回
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類					
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ					
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類					
ごぼう	アブラムシ類	3～6kg/10a	収穫75日前まで	1回	株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)
みずな	アブラムシ類	3～6kg/10a	定植時	1回	作条散布後土壌混和	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
ばれいしょ			植付時		作条散布	
こまつな			は種前		作条散布後土壌混和	
チンゲンサイ			定植時			
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a	移植前	1回	作条散布後土壌混和	2回以内
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 マメハモグリバエ	6～9kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
ばら	アブラムシ類	1株当たり1～2g				
トルコギキョウ	アザミウマ類					
ゆり	アブラムシ類					
りんどう	アザミウマ類	1株当たり2g				
つつじ類	ツツジゲンバイ					
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10kg/10a	全面散布			
	タマナヤガ	5～10kg/10a				

ジェイエース水溶剤

農薬登録の削除作物について

ジェイエース水溶剤では、

下表①の登録作物が削除されました。

下表①の作物ではジェイエース水溶剤の使用をしないでください。

■ 表① ジェイエース水溶剤 (登録番号 第20967号)
平成26年11月17日 登録変更後 (作物削除)

作物名	
かんきつ	かぶ
トマト	ブロッコリー
ミニトマト	だいこん
なす	

使用方法が変更となった作物

かき・ぶどう・キャベツ・はくさい
レタス・チンゲンサイ・みずな
オクラ・ばれいしょ・茶

ジェイエース水溶剤では、

右表②の登録が変更になりました。

今後は、右表②の使用のとおり

ジェイエース水溶剤を使用してください。

■ 表② ジェイエース水溶剤 (登録番号 第20967号) 平成26年11月17日 登録変更後 (変更作物は 部分、変更は赤字部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かき	カキダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1500倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ		1500～2000倍	収穫60日前まで		
いちじく	アザミウマ類	2000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
キャベツ	ハスモンヨトウ、アオムシ コナガ、ヨトウムシ アブラムシ類 タマナギンウワバ	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
	はくさい	ハスモンヨトウ、アオムシ コナガ、ヨトウムシ アブラムシ類			1500倍		3回以内
レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍					
カリフラワー	ヨトウムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
チンゲンサイ	アブラムシ類	1500倍		収穫21日前まで			
みずな	アブラムシ類	1500倍	100～300L/10a	収穫開始7日前まで	1回	散布	1回
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ	1000倍					
ほうれんそう	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	1回
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニジュウヤホシテントウ アブラムシ類			1000倍 1000～2000倍 300倍	収穫30日前まで		2回以内
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内
てんさい	ヨトウムシ	300倍	25L/10a	収穫45日前まで	3回以内		散布
	テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	1000倍	100～300L/10a				
	茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	60～100倍 1000～2000倍 1000～1500倍	ペーパーポット1冊当り1L(3L/m ²)	育苗期	1回	
だいず	アブラムシ類、ハスモンヨトウ	1000倍	100～300L/10a	収穫60日前まで	3回以内	散布	3回以内 2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内)
ごぼう	アブラムシ類			収穫45日前まで	1回		
あずき	ノメイガ類、アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内		
いんげんまめ	アブラムシ類	1500～2500倍	25～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類						
つつじ類	ツツジゲンバイ	1500倍	200～700L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
つばき類	チャドクガ						
さくら	アメリカシロヒトリ	1500～2000倍	200～700L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	モンクロシャチホコ	1000～1500倍					
ばら	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
きく	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～1500倍	100～300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	マメハモグリハエ オオタバコガ						
グラジオラス	グラジオラスアザミウマ	1000倍	0.3L/m ² 0.3～0.5L/m ² 0.3～1L/m ²	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ゆり	アブラムシ類						
りんどう	アザミウマ類						
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ	1000倍	0.3L/m ² 0.3～0.5L/m ² 0.3～1L/m ²	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	タマナヤガ シバオサゾウムシ成虫						

スミフェート

平成26年11月17日付で
登録内容が変更になりました。

※スミフェート剤をご使用の際は、
以前にご購入された製品につきま
しても、登録内容をご確認のうえ
ご使用ください。

スミフェート粒剤

農薬登録の削除作物について

スミフェート粒剤では、
下表①の登録作物が削除されました。

**下表①の作物ではスミフェート粒剤の
使用をしないでください。**

■表① スミフェート粒剤(登録番号 第21904号)
平成26年11月17日 登録変更後(作物削除)

作物名 **ミニトマト**

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

住友化学株式会社
お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト-i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>

使用方法が変更となった作物

キャベツ・はくさい・ブロッコリー・だいこん・かぶ・なばな・きゅうり・トマト・なす
みずな・ばれいしょ・こまつな・チンゲンサイ

スミフェート粒剤では、下表②の登録が変更になりました。

今後は、下表②の使用方法のとおりスミフェート粒剤を使用してください。

■表② スミフェート粒剤(登録番号 第21904号) 平成26年11月17日 登録変更後(変更作物は■部分、変更は赤字部分)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ	3~6kg/10a (1株当たり1~2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
はくさい	アブラムシ類				株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a(1株当たり2g)			1回	
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4kg/10a	は種前	1回	作条散布	1回
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫21日前まで		株元散布	
なばな		6kg/10a(1株当たり2g)	定植時	土壌混和処理	1回	
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類	3~6kg/10a (1株当たり1~2g)	定植時	1回	作条散布又は 植穴処理	1回
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ					
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類					
ごぼう	アブラムシ類	3~6kg/10a	収穫75日前まで	1回	株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)
みずな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	作条散布後土壌混和	1回
ばれいしょ		3~6kg/10a	植付時		作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
こまつな			は種前		作条散布後土壌混和	1回
チンゲンサイ			定植時			
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a	移植前	1回	作条散布後土壌混和	2回以内
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 マメハモグリバエ	6~9kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
ばら	アブラムシ類	1株当たり1~2g				
トルコギキョウ	アザミウマ類					
ゆり	アブラムシ類					
りんどう	アザミウマ類	1株当たり2g				
つつじ類	ツツジグンバイ					
芝	スジキリヨトウ シバツトガ タマナヤガ	10kg/10a 5~10kg/10a			全面散布	

生産者の皆様へ

スミフェート®粒剤 (農林水産省登録第21904号)の 登録内容変更についてのお知らせ

平成26年11月17日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、スミフェート粒剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。

これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。

このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。スミフェート粒剤の使用をしないようお願いします。

作物名
ミニトマト

●使用方法の変更作物について

今後、スミフェート粒剤は、右表のとおり農薬登録変更内容においてご使用願います。

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

変更後の【適用病害虫と使用方法】

*印は収穫物への残留回避のため、アセフェートを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数*	
					本剤	アセフェート剤
キャベツ	アオムシ、ヨトウムシ コナガ、アブラムシ類	3~6 kg/10a (1株当り1~2g)	定植時	植穴処理	1回	2回 (定植時までの処理は1回、 定植後の散布は1回)
はくさい				株元散布		
ブロッコリー	ヨトウムシ	6 kg/10a (1株当り2g)				
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4 kg/10a	は種前	作条散布		
かぶ	アブラムシ類	4 kg/10a	収穫21日 前まで	株元散布		
なばな		6 kg/10a (1株当り2g)	定植時	土壌混和処理		
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ	3~6 kg/10a (1株当り1~2g)	定植時	作条散布 又は 植穴処理		
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類					
みずな	アブラムシ類	3~6 kg/10a	定植時	作条散布後 土壌混和	1回	3回 (植付時処理は1回、 植付後は2回)
ばれいしよ			植付時	作条散布		
こまつな			は種前	作条散布後 土壌混和	1回	
チンゲンサイ			定植時	土壌混和		
ごぼう	ヨトウムシ アブラムシ類		収穫75日 前まで	株元散布	1回	2回 (株元散布は1回、 散布は1回)
たばこ			移植前	作条散布後 土壌混和		2回
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 マメハモグリバエ	6~9 kg/10a	発生初期	株元散布	5回	5回
ばら	アブラムシ類	1株当り 1~2g				
ゆり	アブラムシ類					
トルコギキョウ	アザミウマ類	1株当り2g				
りんどう						
つつじ類	ツツジグンバイ					
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10 kg/10a		全面散布		
	タマネヤガ	5~10 kg/10a				

制限事項



レインボー薬品株式会社

東京都荒川区東日暮里6-60-10

お問い合わせ TEL 03(6740)7777 (平日9:00~17:00 土・日・祝日は休み)