

## 生産者の皆様へ

### オルトラン®粒剤 (農林水産省登録第 19993 号) の登録内容変更についてのお知らせ

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、オルトラン粒剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

#### ●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。オルトラン粒剤の使用をしないようお願いします。

| 作物名     |
|---------|
| ミニトマト   |
| はつかだいこん |

#### ●使用方法の変更作物について

今後、オルトラン粒剤は、右表①のと通りの農薬登録変更内容においてご使用願います。

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表① オルトラン粒剤 使用方法変更内容 (変更部分のみ抜粋)】

| 作物名        | 適用病害虫名                                                       | 使用量                   | 使用時期         | 本剤の使用回数  | 使用方法               | アセフェートを含む農薬の総使用回数                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|
| キャベツ       | アオムシ、コガ<br>ヨウムシ<br>アブラムシ類                                    | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株) | 定植時          | 1回       | 植穴処理               | 2回以内<br>(定植時までの処理<br>は1回以内、定植後<br>の散布は1回以内) |
|            | アブラムシ類                                                       | 6g/m <sup>2</sup>     | 育苗期          | 1回       | 散布                 |                                             |
| トマト        | アブラムシ類<br>オンシツコナジラミ                                          | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株) | 定植時          | 1回       | 作条散布<br>又は<br>植穴処理 | 1回                                          |
| きゅうり<br>なす | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>オンシツコナジラミ                                |                       |              |          | 株元散布               |                                             |
| ピーマン       | アブラムシ類                                                       | 2g/株                  |              |          | 植穴処理               |                                             |
| はくさい       | アオムシ、コガ<br>ヨウムシ<br>アブラムシ類                                    | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株) |              |          | 株元散布               |                                             |
| ブロッコリー     | ヨウムシ                                                         | 6kg/10a<br>(2g/株)     | は種前          | 1回       | 作条散布               | 1回                                          |
| だいこん       | アオムシ、コガ<br>アブラムシ類                                            | 3～4kg/10a             |              |          | 株元散布               |                                             |
| かぶ         | アブラムシ類                                                       | 4kg/10a               | 収穫21日前<br>まで | 2回<br>以内 | 散布                 | 2回以内                                        |
| れんこん       |                                                              |                       | 収穫14日前<br>まで |          | 無人ヘリコプター<br>による散布  |                                             |
| ばれいしょ      | アブラムシ類                                                       | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株) | 植付時          | 1回       | 作条散布               | 3回以内<br>(植付時の処理は<br>1回以内、植付後は<br>2回以内)      |
| たばこ        | ヨウムシ、ネキリムシ<br>アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>ジャガイモガ<br>ヤサシウムシ<br>アブラムシ類 |                       | 移植前          |          | 作条散布後<br>土壌混和      |                                             |
|            |                                                              |                       | 本畑初期         |          | 株元散布               |                                             |

裏面もご覧ください。

## 生産者の皆様へ

### オルトラン®水和剤（農林水産省登録第 19992 号） の登録内容変更についてのお知らせ

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、オルトラン水和剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

#### ●農薬登録の削除作物について

**下記作物への適用が削除されました。オルトラン水和剤の使用をしないようお願いします。**

| 作物名  |     |       |         |
|------|-----|-------|---------|
| かんきつ | トマト | ミニトマト | ブロッコリー  |
| だいこん | なす  | かぶ    | はつかだいこん |

その他、「**たかな**」が非結球あぶらな科葉菜類から作物削除、「**とうもろこし**」が「**未成熟とうもろこし**」に変更されました。

#### ●使用方法の変更作物について

**今後、オルトラン水和剤は、右表②のとりの農薬登録変更内容においてご使用願います。**

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表② オルトラン水和剤 使用方法変更内容（変更部分のみ抜粋）】

| 作物名                                               | 適用病害虫名                                            | 希釈倍数(倍)             | 使用量                                          | 使用時期         | 本剤の使用回数  | 使用方法                | アセフェートを含む農薬の総使用回数                   |                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| キャベツ                                              | ヨトウムシ、ハスモンヨウタマナギンウハバ                              | 1000～1500           | 100～300g/10a                                 | 収穫30日前まで     | 1回       | 散布                  | 2回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内) |                               |
|                                                   | アオムシ、コナガ、アブラムシ類                                   | 1000～2000           |                                              |              |          |                     | 1回                                  |                               |
| はくさい                                              | カブラハバチ、ヨトウムシハスモンヨウ                                | 1,500               |                                              |              |          |                     |                                     | 3回以内                          |
|                                                   | アオムシ、コナガ、アブラムシ類                                   | 1500～2000           |                                              |              |          |                     |                                     |                               |
| レタス                                               | ヨトウムシ                                             | 1000～1500           |                                              | 1回           | 1回       |                     | 3回以内                                |                               |
|                                                   | オオタバコガ                                            | 1,000               |                                              |              |          |                     |                                     |                               |
| 非結球あぶらな科葉菜類<br>(ケール、からしなみずな、ルッコラ、 <b>たかな</b> を除く) | アブラムシ類                                            | 1,500               |                                              | 収穫21日前まで     | 2回以内     |                     | 1回                                  | 1回                            |
| オクラ                                               | アブラムシ類、ミドリヨコバイ                                    | 1,000               | 収穫開始7日前まで                                    |              |          |                     |                                     |                               |
| ばれいしょ                                             | テントウムシダマシ幼虫<br>ヨトウムシ                              | 300                 | 25g/10a                                      | 収穫30日前まで     | 3回以内     |                     | 無人ヘリコプターによる散布                       | 4回以内<br>(育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内) |
|                                                   | アブラムシ類                                            |                     |                                              |              |          | 1000～1500           |                                     |                               |
|                                                   | アブラムシ類、ジャガイモガ                                     |                     |                                              |              |          | 1,000               |                                     |                               |
| てんさい                                              | ヨトウムシ<br>テンサイモグリハナハエ                              | 16<br>300<br>60～100 | 1.6g/10a<br>25g/10a<br>2.5～3g/m <sup>2</sup> | 育苗期          | 1回       | 散布<br>灌注            | 3回以内                                |                               |
|                                                   | トビハムシ類                                            |                     |                                              |              |          |                     |                                     | 1,000                         |
|                                                   | ヨトウムシ                                             |                     |                                              |              |          |                     |                                     | 1000～1500                     |
|                                                   | トビハムシ類                                            |                     |                                              |              |          |                     |                                     | 60～100                        |
| 未成熟とうもろこし                                         | アブラムシ類                                            | 1,000               | 100～300g/10a                                 | 収穫7日前まで      | 2回以内     | 散布                  | 2回以内                                |                               |
| あずき                                               | アズキノメイガ<br>アブラムシ類、ヨトウムシ                           |                     |                                              | 収穫14日前まで     |          |                     |                                     |                               |
|                                                   | ハスモンヨウ、マメシキイガ<br>アブラムシ類                           |                     |                                              | 収穫60日前まで     |          |                     |                                     | 3回以内                          |
| だいず                                               | アブラムシ類                                            | 16                  | 1.6g/10a                                     |              |          |                     |                                     |                               |
| たまねぎ                                              | ネギアザミウマ                                           | 1000～1500           | 100～300g/10a                                 | 収穫21日前まで     | 5回以内     | 散布<br>無人ヘリコプターによる散布 | 5回以内                                |                               |
|                                                   |                                                   | 300                 | 25g/10a                                      |              |          |                     |                                     |                               |
|                                                   |                                                   | 16                  | 1.6g/10a                                     |              |          |                     |                                     |                               |
| ぶどう                                               | チャノキイロアザミウマ<br>フタテヒメヨコバイ                          | 1500～2000           | 200～700g/10a                                 | 収穫60日前まで     | 1回       | 散布                  | 1回                                  |                               |
|                                                   | ハマキムシ類                                            | 1,500               |                                              |              |          |                     |                                     |                               |
| かき                                                | カキタアザミウマ<br>チャノキイロアザミウマ<br>カキノハタムシガ<br>フジコナカイガラムシ |                     | 1000～2000<br>1000～1500                       | 200～400g/10a | 摘採45日前まで | 1回                  | 散布                                  | 1回                            |
|                                                   | チャノキイロアザミウマ<br>チャノミドリヒメヨコバイ                       |                     |                                              |              |          |                     |                                     |                               |
| 茶                                                 | チャノコカクモンハマキ                                       | 1000～1500           |                                              |              |          |                     |                                     |                               |

裏面もご覧ください。

平成26年11月17日付で  
登録内容が変わりました。

ホクコー  
オルトラン<sup>®</sup> 粒 剤  
水和剤



【粒剤：農林水産省登録第13177号】【水和剤：農林水産省登録第13175号】

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、ホクコーオルトラン粒剤・水和剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

◆ 農薬登録の削除作物について

下記、登録削除作物ではホクコーオルトラン剤を使用しないようお願いします。

| ホクコー<br>オルトラン粒剤 | 作物名     | 登録削除の内容 |
|-----------------|---------|---------|
|                 | ミニトマト   | 作物を削除   |
|                 | はつかだいこん |         |

| ホクコー<br>オルトラン水和剤 | 作物名     | 登録削除の内容 |
|------------------|---------|---------|
|                  | かんきつ    | 作物を削除   |
|                  | トマト     |         |
|                  | ミニトマト   |         |
|                  | ブロッコリー  |         |
|                  | なす      |         |
|                  | だいこん    |         |
|                  | かぶ      |         |
|                  | はつかだいこん |         |

その他、「たかな」が  
非結球あぶらな科  
葉菜類から作物削除、  
「とうもろこし」が  
「未成熟とうもろこし」に  
変更されました。

◆ 使用方法の変更作物について

今後、ホクコーオルトラン剤は表①および表②のとおりの変更された登録内容においてご使用願います。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

裏面もご覧ください。

表① ホクコーオルトラン粒剤

登録縮小に該当する作物  
赤 字：変更部分

平成26年11月17日現在

| 作物名          | 適用病害虫名                                              | 使用量                                                                   | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法                                                       | アセフェートを含む農薬の総使用回数                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| キャベツ         | アオムシ、コナガヨウムシ<br>アブラムシ類                              | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株)                                                 | 定植時      | 1回      | 種穴処理                                                       | 2回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、<br>定植後の散布は1回以内) |
|              | アブラムシ類                                              | 6g/m <sup>2</sup>                                                     | 育苗期      | 1回      | 散布                                                         |                                         |
| トマト          | アブラムシ類<br>オシツコナシラミ                                  | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株)                                                 | 定植時      | 1回      | 作条散布<br>又は<br>種穴処理                                         | 1回                                      |
| きゅうり<br>なす   | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>オシツコナシラミ                        |                                                                       |          |         | 種元散布                                                       |                                         |
| ピーマン         | アブラムシ類                                              | 2g/株                                                                  |          |         | 種穴処理                                                       |                                         |
| はくさい         | アオムシ、コナガヨウムシ<br>アブラムシ類                              | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株)                                                 |          |         | 種元散布                                                       |                                         |
| ブロッコリー       | ヨウムシ                                                | 6kg/10a<br>(2g/株)                                                     | は種前      | 1回      | 作条散布                                                       | 1回                                      |
| だいこん         | アオムシ、コナガアブラムシ類                                      | 3～4kg/10a                                                             |          |         | 種元散布                                                       |                                         |
| かぶ           | アブラムシ類                                              | 4kg/10a                                                               | 収穫21日前まで |         | 種元散布                                                       | 2回以内<br>(株元散布は1回以内、<br>散布は1回以内)         |
| ごぼう          | アブラムシ類                                              | 3～6kg/10a                                                             | 収穫75日前まで | 1回      | 種元散布                                                       | 2回以内                                    |
| れんこん         |                                                     | 4kg/10a                                                               | 収穫14日前まで | 2回以内    | 散布<br>無人ヘリコプター<br>による散布                                    | 3回以内<br>(植付時の処理は1回以内、<br>植付後は2回以内)      |
| ばれいしょ        | アブラムシ類                                              | 3～6kg/10a<br>(1～2g/株)                                                 | 植付時      | 1回      | 作条散布                                                       | 3回以内                                    |
| えだまめ         | ハスモンヨトウ                                             | 3～6kg/10a                                                             | 収穫21日前まで | 3回以内    | 生育期株元散布                                                    | 3回以内                                    |
| なばな          | アブラムシ類                                              | 6kg/10a                                                               | 定植時      | 1回      | 種溝土壌混和                                                     | 1回                                      |
|              |                                                     |                                                                       | は種時      |         | 播溝土壌混和                                                     |                                         |
| 花き類・<br>観葉植物 | アザミウマ類<br>アブラムシ類                                    | 3～6kg/10a                                                             | 発生初期     | 5回以内    | 株元散布                                                       | 5回以内                                    |
|              | ヨウムシ類                                               |                                                                       |          |         |                                                            |                                         |
|              | 宿根スターチス<br>カーネーション                                  |                                                                       |          |         |                                                            |                                         |
|              | アリウム                                                |                                                                       |          |         |                                                            |                                         |
| きく           | ネギコガ                                                | 6kg/10a                                                               |          |         |                                                            |                                         |
|              | ネキリムシ類                                              |                                                                       |          |         |                                                            |                                         |
|              | ハモグリバエ類                                             |                                                                       |          |         |                                                            |                                         |
| たदैい         | アブラムシ類                                              | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm、使用<br>土壌約1.5～4L)<br>当り50g | 定植時      | 1回      | 本剤の所定量を<br>セル成型育苗<br>トレイまたは<br>ペーパーポットの<br>上から均一に<br>散布する。 | 1回                                      |
|              |                                                     | 6kg/10a                                                               |          |         | 株元散布                                                       |                                         |
| いぐさ          | イグサシシムシガ                                            | 4kg/10a                                                               | 生育期      | 2回以内    | 湛水散布                                                       | 2回以内                                    |
| 芝            | スジキリヨウ<br>シバツトガ                                     | 10kg/10a                                                              | 発生初期     | 5回以内    | 全面散布                                                       | 5回以内                                    |
|              | タマナヤガ                                               | 5～10kg/10a                                                            |          |         |                                                            |                                         |
| たばこ          | ヨウムシ、ネキリムシ<br>アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>ジャガイモガ<br>ヤサイゾウムシ | 3～6kg/10a                                                             | 移植前      | 1回      | 作条散布後<br>土壌混和                                              | 2回以内                                    |
|              | アブラムシ類                                              |                                                                       | 本畑初期     |         | 株元散布                                                       |                                         |

表② ホクコーオ尔特ラン水和剤

登録縮小に該当する作物

赤 字 : 変更部分

平成26年11月17日現在

| 作物名                                                   | 適用病害虫名                  | 希釈倍数(倍)   | 使用流量             | 使用時期      | 本剤の使用回数 | 使用方法              | アセフェートを含む<br>農薬の総使用回数                  |          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------------------------|----------|--|--|--|
| キャベツ                                                  | ヨウムシ、ハスモンヨウ<br>タナギンウバ   | 1000～1500 | 100～300<br>L/10a | 収穫30日前まで  | 1回      | 散布                | 2回以内<br>(定植時までの処理は1回以内<br>定植後の散布は1回以内) |          |  |  |  |
|                                                       | アオムシ、コナガ、アブラムシ類         | 1000～2000 |                  |           |         |                   | 1回                                     |          |  |  |  |
| はくさい                                                  | カブラハバチ、ヨウムシ<br>ハスモンヨウ   | 1500      |                  |           | 3回以内    |                   | 1回                                     |          |  |  |  |
|                                                       | アオムシ、コナガ、アブラムシ類         | 1500～2000 |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| レタス                                                   | ヨウムシ                    | 1000～1500 | 100～300<br>L/10a | 収穫21日前まで  | 3回以内    | 散布                | 3回以内                                   |          |  |  |  |
|                                                       | オオタバコガ                  | 1000      |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| 非結球レタス                                                | ヨウムシ                    | 1000～1500 |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| カリフラワー                                                | オオタバコガ                  | 1000      |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| 非結球あぶらな<br>科葉菜類<br>(ケール、からしな、<br>みずな、ルッコラ、<br>たかなを除く) | アブラムシ類                  | 1500      | 100～300<br>L/10a | 収穫21日前まで  | 1回      | 散布                | 1回                                     |          |  |  |  |
| しょうが                                                  | アワノメイガ                  | 1000      | 100～300<br>L/10a | 収穫45日前まで  | 2回以内    | 散布                | 2回以内                                   |          |  |  |  |
| ごぼう                                                   | アブラムシ類                  |           |                  | 1回        | 1回      |                   | (株元散布は1回以内、<br>散布は1回以内)                |          |  |  |  |
| オクラ                                                   | アブラムシ類、ミドリヨコバイ          | 1000      | 100～300<br>L/10a | 収穫開始7日前まで | 1回      | 散布                | 1回                                     |          |  |  |  |
| ばれいしょ                                                 | テンウムシダマシ幼虫<br>ヨウムシ      |           |                  | 収穫30日前まで  | 2回以内    |                   | 3回以内<br>(植付時の処理は1回以内<br>植付後は2回以内)      |          |  |  |  |
|                                                       | アブラムシ類                  | 300       |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
|                                                       | アブラムシ類、ジャガイモガ           | 1000～1500 |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| てんさい                                                  | ヨウムシ                    | 1000～1500 | 100～300<br>L/10a | 収穫45日前まで  | 3回以内    | 散布                | 4回以内<br>(育苗期の灌注は1回以内<br>散布は3回以内)       |          |  |  |  |
|                                                       | テンサイモグリハナバエ             | 1000      |                  |           |         | 無人ヘリコプター<br>による散布 |                                        |          |  |  |  |
|                                                       | トビハムシ類                  | 1000      |                  |           |         | 散布                |                                        |          |  |  |  |
|                                                       | ヨウムシ                    | 16        |                  |           |         | 2.5L/10a          |                                        |          |  |  |  |
|                                                       | トビハムシ類                  | 300       | 25L/10a          |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| 未成熟<br>とうもろこし                                         | アブラムシ類                  | 1000      | 100～300<br>L/10a | 収穫7日前まで   | 2回以内    | 散布                | 2回以内                                   |          |  |  |  |
| あずき                                                   | アズキノメイガ<br>アブラムシ類、ヨウムシ  | 1000      | 100～300<br>L/10a | 収穫14日前まで  | 3回以内    | 散布                | 3回以内                                   |          |  |  |  |
| だいず                                                   | ハスモンヨウ、マダニクイガ<br>アブラムシ類 |           |                  | 収穫60日前まで  |         | 無人ヘリコプター<br>による散布 |                                        |          |  |  |  |
|                                                       | アブラムシ類                  | 16        |                  |           |         |                   |                                        | 1.6L/10a |  |  |  |
| えだまめ                                                  | ハスモンヨウ、アブラムシ類           | 1000      | 100～300<br>L/10a | 収穫21日前まで  | 5回以内    | 散布                | 5回以内                                   |          |  |  |  |
| いんげんまめ                                                | アブラムシ類                  |           |                  | 収穫14日前まで  |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| たまねぎ                                                  | ネギアザミウマ                 | 1000～1500 |                  | 収穫21日前まで  |         |                   |                                        |          |  |  |  |
|                                                       |                         | 300       | 25L/10a          |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
|                                                       |                         | 16        | 1.6L/10a         |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |
| にんにく                                                  | ネギコガ、アブラムシ類             | 1000      | 100～300L/10a     | 収穫7日前まで   | 2回以内    | 散布                | 2回以内                                   |          |  |  |  |
| ぶどう                                                   | チャノキロアザミウマ<br>フタデヒメコバイ  | 1500～2000 | 200～700<br>L/10a | 収穫60日前まで  | 1回      | 散布                | 1回                                     |          |  |  |  |
|                                                       | ハマキムシ類                  | 1500      |                  |           |         |                   |                                        |          |  |  |  |

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

| 作物名               | 適用病害虫名                                          | 希釈倍数(倍)   | 使用流量             | 使用時期                | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセフェートを含む農薬の総使用回数 |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------|------|-------------------|------|--------------|----|-----|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| かき                | カキダアザミウマ<br>チャノキロアザミウマ<br>カキノハタムシガ<br>フジコカイガラムシ | 1500      | 200～700<br>L/10a | 収穫45日前まで            | 2回以内    | 散布   | 2回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| いちじく              | アザミウマ類                                          | 2000      | 200～700L/10a     | 収穫45日前まで            | 1回      | 散布   | 1回                |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 茶                 | チャノキロアザミウマ<br>チャノミドリヒメコバエ                       | 1000～2000 | 200～400<br>L/10a | 摘採45日前まで            | 1回      | 散布   | 1回                |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | チャノコカクモンハマキ                                     | 1000～1500 |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| さんしょう<br>(果実)     | チャノキロアザミウマ                                      | 1500      | 200～700<br>L/10a | 収穫14日前まで            | 1回      | 散布   | 1回                |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| だいおう              | ヨウムシ                                            | 1000      | 100～300<br>L/10a | 生育期但し、<br>収穫230日前まで | 3回以内    |      | 3回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| みしまさいこ            | アブラムシ類                                          | 1500      |                  | 収穫30日前まで            | 5回以内    |      | 5回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薬用にんじん            |                                                 |           |                  | 収穫180日前まで           |         |      | 3回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ソルガム              |                                                 |           |                  | 収穫30日前まで            |         |      | 1回                | 1回   |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| やまのいも             | ヤマノイモコガ<br>ジャガイモヒゲナガアブラムシ                       | 1000      | 収穫45日前まで         | 1回                  | 1回      |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葉しょうが             | アワノメイガ                                          |           | 収穫21日前まで         |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| たばこ               | ヨウムシ、タバコアオムシ<br>アブラムシ類                          | 1500～2500 | 25～180<br>L/10a  | 収穫10日前まで            | 2回以内    |      | 2回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | ヤサイゾウムシ                                         | 1000～2000 | 1L/㎡             | 苗床期                 |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | ジャガイモガ若齢幼虫<br>ジャガイモガ中齢幼虫                        | 1500～2000 | 25～180<br>L/10a  | 収穫10日前まで            |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| つつじ類              | ツツジゲンバイ                                         | 1500      | 200～700<br>L/10a | 発生初期                | 5回以内    | 散布   | 5回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| つばき類              | チャドクガ                                           |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| さくら               | モンクローヤチホコ                                       | 1000～1500 |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | アメリカシロヒトリ                                       | 1500～2000 |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花き類・<br>観葉植物      | アザミウマ類、アブラムシ類<br>アオムシ、ヨウムシ類                     | 1000～1500 | 100～300<br>L/10a |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| きく                | マメハモグリバエ、オオタバコガ                                 | 1000      |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ストック              | コナガ、ハイマダラメイガ                                    |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿根アスター            | ヨメナスジハモグリバエ                                     |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オンシジウム            | カイガラムシ類                                         |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カーネーション           | コナガ                                             |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ひまわり              | タバコガ                                            |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斑入りアマドコロ<br>リアトリス | ハマキムシ類                                          |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樹木類               |                                                 |           |                  |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| グラジオラス            | アザミウマ類                                          |           |                  |                     |         |      |                   | 1000 | 200～700L/10a | —  | 植付時 | 1回 | 10分間<br>球根浸漬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 芝                 | シバツグガ、タナヤガ                                      | 1000      | 0.25～2L/㎡        |                     |         |      |                   | 発生初期 | 5回以内         | 散布 | 1回  |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | スジキリトウ、ケラ                                       |           | 1～2L/㎡           |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | シバオサゾウムシ成虫                                      |           | 2L/㎡             |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | アカツツリガ                                          |           | 0.5～1L/㎡         |                     |         |      |                   |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| もりあざみ             | アブラムシ類                                          | 1500      | 100～300<br>L/10a | 収穫45日前まで            | 1回      | 散布   | 1回                |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| まめ科牧草             |                                                 | 1000      |                  |                     | 3回以内    |      | 3回以内              |      |              |    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



使用者の皆さまへ

## 家庭園芸用 GFオルトラン®水和剤

(農林水産省登録第21819号)

## 登録内容変更についてのお知らせ

平成26年11月17日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、**家庭園芸用GFオルトラン水和剤**は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。

これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願い致します。

### ●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。家庭園芸用GFオルトラン水和剤の使用をしないようお願いします。

#### 家庭園芸用 GF オルトラン水和剤

| 作物名     |        |
|---------|--------|
| かんきつ    | なす     |
| トマト     | ミニトマト  |
| はつかだいこん | ブロッコリー |
| だいこん    |        |

その他、「とうもろこし」が「未成熟とうもろこし」に変更されます。

### ●使用方法の変更作物について

今後、家庭園芸用GFオルトラン水和剤は、右表のとりの農薬登録変更内容においてご使用願います。

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

### 【表 家庭園芸用GFオルトラン水和剤 使用方法変更内容（変更部分のみ抜粋）】

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名   | 適用害虫名                               | 希釈倍数                               | 使用液量                         | 使用時期                         | 総使用回数 ※                                                 | 使用方法 |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| キャベツ  | ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ<br>タマナギンウバ         | 1,000～1,500倍                       | 100～300<br>mℓ/m <sup>2</sup> | 収穫30日<br>前まで                 | 本剤：1回<br>アセフェート：2回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、<br>定植後の散布は1回以内) | 散布   |
|       | アオムシ<br>コナガ<br>アブラムシ類               | 1,000～2,000倍<br>1,500～2,000倍       |                              |                              | 1回                                                      |      |
| はくさい  | カブラハバチ<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ          | 1,500倍                             |                              |                              | 3回以内                                                    |      |
|       | レタス                                 | ヨトウムシ<br>オオタバコガ                    |                              |                              | 本剤：2回以内<br>アセフェート：3回以内<br>(植付時の処理は1回以内、<br>植付後は2回以内)    |      |
| ばれいしょ | アブラムシ類<br>ジャガイモガ                    | 1,000～1,500倍                       | 200～700<br>mℓ/m <sup>2</sup> | 収穫7日<br>前まで<br>収穫開始<br>7日前まで | 2回以内                                                    | 散布   |
|       | 未成熟<br>とうもろこし                       | アブラムシ類                             |                              |                              | 1回                                                      |      |
| オクラ   | アブラムシ類<br>ミドリヨコバイ                   | 1,500～2,000倍<br>1,500倍             |                              |                              | 1回                                                      |      |
|       | ぶどう                                 | チャノキロアザミウマ<br>フタテンヒメヨコバイ<br>ハマキムシ類 |                              |                              | 2回以内                                                    |      |
| かき    | カキクダアザミウマ<br>カキノヘタムシガ<br>チャノキロアザミウマ | 1,500倍                             |                              |                              | 2回以内                                                    |      |

作物名「かき」の「適用害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」が削除されました。



使用者の皆さまへ

## 家庭園芸用 GFオルトラン®粒剤

(農林水産省登録第 21789 号)

## 登録内容変更についてのお知らせ

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、**家庭園芸用GFオルトラン粒剤**は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。

これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願い致します。

### ●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。家庭園芸用GFオルトラン粒剤の使用をしないようお願いします。

### 家庭園芸用 GF オルトラン粒剤

| 作物名   |         |
|-------|---------|
| ミニトマト | はつかだいこん |

### ●使用方法の変更作物について

今後、家庭園芸用GFオルトラン粒剤は、右表のとりの農薬登録変更内容においてご使用願います。

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表 家庭園芸用GFオルトラン粒剤 使用方法変更内容（変更部分のみ抜粋）】

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名        | 適用害虫名                          | 使用量                                   | 使用時期     | 総使用回数 ※                                                 | 使用方法               |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| きゅうり<br>なす | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>オンシツコナジラミ  | 3～6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り<br>1～2g) | 定植時      | 1回                                                      | 植溝散布<br>又は<br>植穴処理 |
| トマト        | アブラムシ類<br>オンシツコナジラミ            |                                       |          |                                                         |                    |
| ピーマン       | アブラムシ類                         | 1株当り2g                                | 育苗期      | 本剤：1回<br>アセフェート：2回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、<br>定植後の散布は1回以内) | 株元散布<br>散布         |
| キャベツ       | アオムシ<br>コナガ<br>ヨトウムシ<br>アブラムシ類 | 3～6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り<br>1～2g) |          |                                                         |                    |
| はくさい       | アブラムシ類                         |                                       | 定植時      | 1回                                                      | 植穴処理               |
| ブロッコリー     | ヨトウムシ                          | 6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り2g)         |          |                                                         |                    |
| だいこん       | アオムシ<br>コナガ<br>アブラムシ類          | 3～4g/m <sup>2</sup>                   | は種前      | 1回                                                      | 株元散布               |
| かぶ         |                                | 4g/m <sup>2</sup>                     | 収穫21日前まで |                                                         | 植溝散布               |
| ばれいしょ      | アブラムシ類                         | 3～6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り<br>1～2g) | 植付時      | 本剤：1回<br>アセフェート：3回以内<br>(植付時の処理は1回以内、<br>植付後は2回以内)      | 株元散布               |

使用者の皆さまへ

## オルトラン® DX粒剤

(農林水産省登録第 21733 号)

## 登録内容変更についてのお知らせ

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、**オルトラン DX 粒剤**は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。

これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願い致します。

### ●使用方法の変更作物について

**今後、オルトラン DX 粒剤は、下表のとおり農薬登録変更内容においてご使用願います。**  
使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表 **オルトラン DX 粒剤** 使用方法変更内容 (変更部分のみ抜粋)】

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名  | 適用害虫名  | 使用量  | 使用時期 | 総使用回数 ※                                                                                               | 使用方法         |
|------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| きゅうり | コナジラミ類 | 2g／株 | 定植時  | 本剤：1回<br>アセフェート：1回<br>クロチアニジン：4回以内<br>(育苗期の株元処理及び<br>定植時の土壌混和は<br>合計1回以内、<br>散布及び定植後の株元散布は<br>合計3回以内) | 植穴処理<br>土壌混和 |
| なす   | アブラムシ類 |      |      |                                                                                                       |              |
| トマト  |        | 1g／株 |      |                                                                                                       |              |

## 使用者の皆さまへ

### 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン®粒剤 (農林水産省登録第 19568 号) の登録内容変更についてのお知らせ

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。

このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

#### ●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤の使用をしないようお願いします。

| 作物名     |
|---------|
| ミニトマト   |
| はつかだいこん |

#### ●使用方法の変更作物について

今後、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤は、表①のと通りの農薬登録変更内容においてご使用願います。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表① 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤 (変更部分のみ抜粋)】

| 作物名        | 適用害虫名                       | 使用量                               | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法               | 7セクトを含む農薬の総使用回数                          |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------|--------------------|------------------------------------------|
| キャベツ       | アオシ、コガ<br>ヨウムシ<br>アブラムシ類    | 3~6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り1~2g) | 定植時      | 1回      | 植穴処理               | 2回以内<br>(定植時までの<br>処理は1回以内、<br>定植後は1回以内) |
|            | アブラムシ類                      | 6g/m <sup>2</sup>                 | 育苗期      | 1回      | 散布                 |                                          |
| はくさい       | アオシ、コガ<br>ヨウムシ<br>アブラムシ類    | 3~6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り1~2g) | 定植時      | 1回      | 植穴処理               | 1回                                       |
| トマト        | アブラムシ類<br>オンツコナジラミ          |                                   |          |         | 植溝散布<br>又は<br>植穴処理 |                                          |
| きゅうり<br>なす | アブラムシ類<br>アサシマ類<br>オンツコナジラミ |                                   |          |         | 株元散布               |                                          |
| ピーマン       | アブラムシ類                      | 1株当り2g                            |          |         | 株元散布               |                                          |
| ブロッコリー     | ヨウムシ                        | 6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り2g)     |          |         | 株元散布               |                                          |
| だいこん       | アオシ、コガ<br>アブラムシ類            | 3~4g/m <sup>2</sup>               | は種前      | 1回      | 植溝散布               | 1回                                       |
| かぶ         | アブラムシ類                      | 4g/m <sup>2</sup>                 | 収穫21日前まで |         | 株元散布               |                                          |
| ばれいしょ      |                             | 3~6g/m <sup>2</sup><br>(1株当り1~2g) | 植付時      | 1回      | 植溝散布               | 3回以内<br>(植付時の処理<br>は1回以内、<br>植付後は2回以内)   |

裏面もご覧ください。



## 使用者の皆さまへ

# 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン® 水和剤 (農林水産省登録第 19566 号) の登録内容変更についてのお願い

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。

このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

## ●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤の使用をしない  
ようお願いします。

| 作物名    |         |      |    |
|--------|---------|------|----|
| かんきつ   | ミニトマト   | トマト  | なす |
| ブロッコリー | はつかだいこん | だいこん |    |

その他、「とうもろこし」が「未成熟とうもろこし」に変更されました。

## ●使用方法の変更作物について

今後、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤は、表②のと通りの農薬登録変更内容においてご使用願います。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表② 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤 (変更部分のみ)】

| 作物名           | 適用害虫名                              | 希釈倍率(倍)   | 使用液量              | 使用時期         | 本剤の使用回数       | 使用方法 | アセフェートを含む農薬の総使用回数                        |      |
|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|------|------------------------------------------|------|
| キャベツ          | ヨトウムシ、ハスモンヨトウ<br>タマナギンウバ           | 1000～1500 |                   | 収穫30日<br>前まで | 1回            | 散布   | 2回以内<br>(定植時までの処理は<br>1回以内、<br>定植後は1回以内) |      |
|               | アオムシ、コナガ、<br>アブラムシ類                | 1000～2000 |                   |              |               |      |                                          |      |
| はくさい          | カブラハバチ、<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ        | 1500      | 100～300           |              | 3回以内          |      | 1回                                       |      |
|               | アオムシ、コナガ、<br>アブラムシ類                | 1500～2000 | ml/m <sup>2</sup> |              |               |      |                                          |      |
| レタス           | ヨトウムシ                              | 1000～1500 |                   |              | 2回以内          |      | 3回以内                                     |      |
|               | オオタバコガ                             | 1000      |                   |              |               |      |                                          |      |
| ばれいしょ         | テントウムシダマシ幼虫<br>ヨトウムシ               | 1000      |                   |              | 1回            |      | 3回以内<br>(植付時の処理は1回<br>以内、植付後は2回<br>以内)   |      |
|               | アブラムシ類、<br>ジャガイモガ                  | 1000～1500 |                   |              |               |      |                                          |      |
| オクラ           | アブラムシ類、<br>ミドリヨコバイ                 | 1000      |                   |              | 収穫開始<br>7日前まで |      | 1回                                       | 1回   |
| 未成熟<br>とうもろこし | アブラムシ類                             | 1000      |                   |              | 収穫7日<br>前まで   |      | 2回以内                                     | 2回以内 |
| ぶどう           | チャノキイロアザミウマ<br>フタテンヒメヨコバイ          | 1500～2000 |                   | 収穫60日<br>前まで | 1回            | 1回   |                                          |      |
|               | ハマキムシ類                             | 1500      | 200～700           |              |               |      |                                          |      |
| かき            | カキクダアザミウマ<br>チャノキイロアザミウマ<br>カキハナムシ | 1500      | ml/m <sup>2</sup> | 収穫45日<br>前まで | 2回以内          | 2回以内 |                                          |      |

裏面もご覧ください。