

(8) 年齢別悪性新生物(男)

平成20年 (単位:人)

死因 \ 年齢	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	計	
気管、気管支及び肺の悪性新生物												3	3	3	5	7	9	3				33	
肝及び肝内胆管の悪性新生物												2		1	2	6	1	1				13	
胃の悪性新生物										1		1	3	1	5	4	8	2	2			27	
膵の悪性新生物												2	1	2	2		1					8	
悪性リンパ腫															1	1	1		1			4	
結腸の悪性新生物														2		4	1	2	1			10	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物														5		2	2					9	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物												1	1	2	2	2		1				9	
前立腺の悪性新生物												1		1	1		1	2				6	
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物												2		2	1	1						6	
食道の悪性新生物										1	1	1										3	
その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物																						0	
膀胱の悪性新生物																	3		2			5	
白血病												1				2	1					4	
その他の悪性新生物		1							1						1	1	4	2				10	
計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	14	8	19	20	30	32	13	6	0	0	147

※このデータは平成20年人口動態統計(福井県)を元に作成しています。