

福井県糖尿病性腎症重症化予防プログラム <別冊版>

国保データベース（KDB）システムから抽出

1 福井県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく受診勧奨対象者数

(1) 糖尿病（2型糖尿病）

29年度に糖尿病のレセプトあり
↓
29年度の特健康診結果から
①の条件で抽出

①29年度の特健康診で空腹時血糖 126mg/dl 以上
又は HbA1c6.5%以上で、尿たんぱくが+以上

健診データ 年度	福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
29年度	169	29	96	86	380

26~29年度に糖尿病のレセプトあり
↓
29年度の特健康診結果から②の条件で抽出

②29年度の特健康診で HbA1c7.0 以上、かつ 30年度に腹囲、医療情報なし

健診データ 年度	福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
29年度	22	8	11	10	51

※ ①+②の受診勧奨実施数（30年度見込み）

福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
160	149	74	62	445

(2) 慢性腎臓病（2型糖尿病）

③尿たんぱくが2+以上

29年度に糖尿病のレセプトあり
↓
29年度の特定健診結果から
③の条件で抽出

健診データ 年度	福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
29年度	125	14	68	55	262

④eGFR 値が 45ml/min/1.73m² 未満

ア eGFR 値が 30~45ml/min/1.73m²

29年度に糖尿病のレセプトあり
↓
29年度の特定健診結果から
④の条件で抽出

健診データ 年度	福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
29年度	103	13	54	49	219

イ eGFR 値が 30ml/min/1.73m² 未満

健診データ 年度	福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
29年度	18	1	8	15	42

※ ③+④の受診勧奨実施数（30年度見込み）

福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
53	9	7	8	77

2 福井県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく保健指導対象者数

29年度に糖尿病のレセプトあり
↓
29年度の特定健診結果から
⑤の条件で抽出

⑤糖尿病のレセプトがあり、eGFR 値が 30~45ml/min/1.73m²

レセプトデータ 年度	福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
29年度	103	13	54	49	219

※ ⑤の保健指導実施数（30年度見込み）

福井・坂井	奥越	丹南	嶺南	合計
62	5	74	82	223

〔参考〕

「糖尿病である」という条件を、糖尿病のレセプトの有無ではなく、健診データで抽出した場合

※ 29年度の特定健診結果から抽出。

() 内は、29年度に、糖尿病・高血圧のいずれのレセプトも無い者の人数。

糖尿病であって 空腹時血糖 126mg/dl以上 または 随時血糖 200mg/dl以上 または HbA1c 6.5%以上			尿蛋白				計
			(-)	(±)	(+)	(++) 以上	
GFR 区分	G1	>90	1,801 (226)	263 (31)	130 (17)	64 (8)	2,258 (282)
	G2	60~89					
	G3 a	45~59	379 (32)	67 (4)	49 (8)	28 (1)	523 (45)
	G3 b	30~44	43 (0)	15 (1)	14 (0)	12 (1)	84 (2)
	G4	15~29	3 (0)	1 (0)	1 (0)	10 (0)	15 (0)
	G5	<15					
計			2,226 (258)	346 (36)	194 (25)	114 (10)	2,880 (329)