（11）ブロッコリー

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
花蕾腐敗病	ﾏｽﾀﾋﾞｰｽ水和剤	ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ ﾛﾃﾞｼｱ水和剤	「-（生）」		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	-	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
黒腐病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
	ｶｽﾐﾝﾎﾞﾙﾄﾞｰ	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ・銅水和剤	24,M1		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾖﾈﾎﾟﾝ水和剤	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤	M1		500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
軟腐病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
根こぶ病	ｵﾗｸﾙ粉剤	ｱﾐｽﾙﾌﾞﾛﾑ粉剤	21		20kg/10a		定植前	作条土壌混和	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					30kg/10a		定植前	全面土壌混和	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾗﾝﾏﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤	21		2000倍	250mL/株	収穫14日前まで	株元灌注	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					500倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(30×60cm､使用土壌約2.5～7ﾘｯﾄﾙ)当り2ﾘｯﾄﾙ	定植前日～当日	灌注	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ｱｵﾑｼ	ｽﾋﾟﾉｴｰｽ顆粒水和剤	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤	5		5000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ・ﾏﾗｿﾝ水和剤	1B,3A	劇	2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		100倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾓｽﾋﾟﾗﾝ粒剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤	4A		0.5～1g/株		定植前日～定植当日	株元散布	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					1g/株		定植時	植穴土壌混和	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾓｽﾋﾟﾗﾝ粒剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤	4A		0.5～1g/株		定植前日～定植当日	株元散布	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					1g/株		定植時	植穴土壌混和	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ｺﾅｶﾞ	ｱﾀﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ｶｽｹｰﾄﾞ乳剤	ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤	15		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤	13	劇	2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ｽﾋﾟﾉｴｰｽ顆粒水和剤	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤	5		5000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ｾﾞﾝﾀｰﾘ顆粒水和剤	BT水和剤	11(A)		1000～2000倍	100～300L/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類(キャベツ、はくさいを除く)
	ﾄｱﾛｰ水和剤CT	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期 但し収穫前日まで	散布	-	野菜類(ﾊﾟｾﾘ､えごま(葉)を除く)
	ﾉｰﾓﾙﾄ乳剤	ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾊﾟﾀﾞﾝSG水溶剤	ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤	14	劇	1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		100倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾓｽﾋﾟﾗﾝ粒剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤	4A		0.5～1g/株		定植前日～定植当日	株元散布	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
					1～2g/株		定植時	植穴土壌混和	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
ﾈｷﾘﾑｼ類	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤3	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤	1B		6～9kg/10a		収穫30日前まで	土壌混和	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ水和剤	UN		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ﾖﾄｳﾑｼ	ｵﾙﾄﾗﾝ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		6kg/10a(2g/株)		定植時	株元散布	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ｼﾞｪｲｴｰｽ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		6kg/10a(2g/株)		定植時	株元散布	1回	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ