

(13) だいこん

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名				
亀裂褐変症(ツグクワ菌)	バシタック水和剤75	メブロニル水和剤	7		1000~1500倍	100~300%/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	だいこん				
	バシタック粉剤DL	バシタック粉剤	U18		20kg/10a		収穫7日前まで	株元散布	4回以内	だいこん				
黒斑細菌病	ズボルトー	銅水和剤	M1		500倍	100~300%/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)				
白さび病	ビシロックフロアブル	ビカルボトランクス水和剤	U17		1000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	だいこん				
					8倍	1.6%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん				
軟腐病	ズボルトー	銅水和剤	M1		500~1000倍	100~300%/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)				
	コサイド3000	銅水和剤	M1		2000倍	100~300%/10a	-	散布	-	野菜類				
	スターナ水和剤	トリニク酸水和剤	31		1000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	だいこん				
	バイクーバ水和剤	非病原性エリネアマトバトリウム水和剤	「-」 (生)」		500~2000倍	150~300%/10a	発病前~発病初期	散布	-	野菜類(かぼちゃ、ズッキーナを除く)				
ツカ症	ビシロックフロアブル	ビカルボトランクス水和剤	U17		1000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	だいこん				
					8倍	1.6%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん				
アムシ	アタプロン乳剤	クダマルアズロン乳剤	15		2000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん				
	エスマルクDF	BT水和剤	11A		1000~2000倍	100~300%/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類				
	ハヴサップ水和剤	フェンバレート・マテソソ水和剤	1B,3A	劇	1000~2000倍	100~300%/10a	収穫35日前まで	散布	3回以内	だいこん				
	フィールドマストフロアブル	ジクロロメゾチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん				
	ブレオフロアブル	ビダリル水和剤	UN		1000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	だいこん				
					16倍	1.6~3.2%/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん				
					32倍	3.2%/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん				
ベネビアOD	シアントラニグロール水和剤	28		2000~4000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん					
				20倍	1~2%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内	だいこん					
ランネット45DF	メタミル水和剤	1A	劇	1000~2000倍	100~300%/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん					
アムシ類	オルトラン粒剤	アセフト粒剤	1B		3~4kg/10a		は種前	作条散布	1回	だいこん				
	ジェイエース粒剤	アセフト粒剤	1B		3~4kg/10a		は種前	作条散布	1回	だいこん				
	ベネビアOD	シアントラニグロール水和剤	28		2000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん				
20倍					1~2%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内	だいこん					
マテソソ乳剤	マテソソ乳剤	1B		1000~3000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	6回以内	だいこん					
カラムシ	フィールドマストフロアブル	ジクロロメゾチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん				
ネズミ	フィールドマストフロアブル	ジクロロメゾチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん				
					フォース粒剤	テアルリン粒剤	3A	劇	4~9kg/10a		は種時	播溝土壌混和	1回	だいこん
									6~9kg/10a		は種時	全面土壌混和	1回	だいこん
6kg/10a		収穫14日前まで	株元散布	1回	だいこん									

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
コガ	アタブロン乳剤	ケルファルアズロン乳剤	15		2000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	エスマルDF	BT水和剤	11A		1000~2000倍	100~300%/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類
	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000~1500倍	100~300%/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	だいこん
	トコロ水和剤CT	BT水和剤	11A		1000~2000倍	100~300%/10a	発生初期 但し収穫前日まで	散布	-	野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)
	トルネードエスDF	インドキサカルブ水和剤	22A		2000倍	100~300%/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
					20倍	1~2%/10a	収穫21日前まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん
	パダンSG水溶剤	カルタップ水溶剤	14	劇	1500倍	100~300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	だいこん
	フィールドマストフロアブル	ジクロロメチルチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん
	プレオフロアブル	ビリダリル水和剤	UN		1000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	だいこん
					16倍	1.6~3.2%/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん
32倍					3.2%/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん	
ベネビアOD	シアントラリアロール水和剤	28		2000~4000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん	
				20倍	1~2%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内	だいこん	
ランネット45DF	メニル水和剤	1A	劇	1000~2000倍	100~300%/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん	
ダイコンハムシ	フィールドマストフロアブル	ジクロロメチルチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん
ネキリムシ類	カネス粉剤	イネサチオン粉剤	1B		6kg/10a		は種時	土壌表面散布土壌混和処理	1回	だいこん
	デフォーン5%ヘイ	NAC粒剤	1A		3~6kg/10a		収穫30日前まで	株元散布	4回以内	だいこん
	ネキリエースK	イネサチオン粒剤	1B		3kg/10a		は種時又は定植時	土壌表面株元処理	1回	だいこん
ネグサレセンチュウ	ネマクリン粒剤	フルビラム粒剤	"[-]"(*)		10~20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
	ビーラム粒剤	フルビラム粒剤	"[-]"(*)		10~20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
ネコセンチュウ	ネマクリン粒剤	フルビラム粒剤	"[-]"(*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
	ビーラム粒剤	フルビラム粒剤	"[-]"(*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
ハマダラメカイ	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000~2000倍	100~300%/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	だいこん
	トルネードエスDF	インドキサカルブ水和剤	22A		2000倍	100~300%/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
					20倍	1~2%/10a	収穫21日前まで	無人航空機による散布	2回以内	だいこん
	フィールドマストフロアブル	ジクロロメチルチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん
	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	28		2000~4000倍	100~300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ベネビアOD	シアントラリアロール水和剤	28		2000~4000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
20倍					1~2%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内	だいこん	
ヨウムシ	アタブロン乳剤	ケルファルアズロン乳剤	15		2000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	エスマルDF	BT水和剤	11A		1000倍	100~300%/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ハクザップ水和剤	フェンハレト・マリンソ水和剤	1B,3A	劇	1000~2000倍	100~300%/10a	収穫35日前まで	散布	3回以内	だいこん
	フィールドマストフロアブル	ジクロロメチルチアズ水和剤	4E		4000倍	100~300%/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ベネビアOD	シアントラリアロール水和剤	28		4000倍	100~300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
					20倍	1~2%/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内	だいこん
	マリックフロアブル	クロマフェジド水和剤	18		2000倍	100~300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	だいこん