（13）だいこん

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
亀裂褐変症(ﾘｿﾞｸﾄﾆｱ菌)	ﾊﾞｼﾀｯｸ水和剤75	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ水和剤	7		1000～1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾊﾞﾘﾀﾞｼﾝ粉剤DL	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤	U18		20kg/10a		収穫7日前まで	株元散布	4回以内	だいこん
黒斑細菌病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
白さび病	ﾋﾟｼﾛｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟｶﾙﾌﾞﾄﾗｿﾞｸｽ水和剤	U17		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	だいこん
軟腐病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
	ｺｻｲﾄﾞ3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類
	ｽﾀｰﾅ水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤	31		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	だいこん
	ﾊﾞｲｵｷｰﾊﾟｰ水和剤	非病原性ｴﾙﾋﾞﾆｱ ｶﾛﾄﾎﾞｰﾗ水和剤	「-（生）」		500～2000倍	150～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病前～発病初期	散布	-	野菜類(かぼちゃ､ｽﾞｯｷｰﾆを除く)
ﾜｯｶ症	ﾋﾟｼﾛｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟｶﾙﾌﾞﾄﾗｿﾞｸｽ水和剤	U17		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	だいこん
ｱｵﾑｼ	ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ｴｽﾏﾙｸDF	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期 但し､収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫35日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ水和剤	UN		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ｵﾙﾄﾗﾝ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～4kg/10a		は種前	作条散布	1回	だいこん
	ｼﾞｪｲｴｰｽ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～4kg/10a		は種前	作条散布	1回	だいこん
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	6回以内	だいこん
ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ	ﾌｫｰｽ粒剤	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤	3A	劇	4～9kg/10a		は種時	播溝土壌混和	1回	だいこん
					6～9kg/10a		は種時	全面土壌混和	1回	だいこん
					6kg/10a		収穫14日前まで	株元散布	1回	だいこん
ｺﾅｶﾞ	ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ｴｽﾏﾙｸDF	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期 但し､収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾄｱﾛｰ水和剤CT	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期 但し収穫前日まで	散布	-	野菜類(ﾊﾟｾﾘ､えごま(葉)を除く)
	ﾄﾙﾈｰﾄﾞｴｰｽDF	ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ水和剤	22A		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾊﾟﾀﾞﾝSG水溶剤	ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤	14	劇	1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ水和剤	UN		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
ﾈｷﾘﾑｼ類	ｶﾙﾎｽ粉剤	ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤	1B		6kg/10a		は種時	土壌表面散布土壌混和処理	1回	だいこん
	ﾃﾞﾅﾎﾟﾝ5%ﾍﾞｲﾄ	NAC粒剤	1A		3～6kg/10a		収穫30日前まで	株元散布	4回以内	だいこん
	ﾈｷﾘｴｰｽK	ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤	1B		3kg/10a		は種時又は定植時	土壌表面株元処理	1回	だいこん
ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ	ﾈﾏｸﾘｰﾝ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
	ﾋﾞｰﾗﾑ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ	ﾈﾏｸﾘｰﾝ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
	ﾋﾞｰﾗﾑ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾄﾙﾈｰﾄﾞｴｰｽDF	ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ水和剤	22A		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾌｪﾆｯｸｽ顆粒水和剤	ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
ﾖﾄｳﾑｼ	ｱﾀﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ｴｽﾏﾙｸDF	BT水和剤	11A		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ・ﾏﾗｿﾝ水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫35日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	ﾏﾄﾘｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤	18		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	だいこん