

## (14) はくさい

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
黒斑病	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
軟腐病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300%/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
	スター水和剤	オキソニク酸水和剤	31		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	はくさい
	バクテリア水和剤	非病原性エルビニアカトボリ水和剤	「-」 (生)		500～2000倍	150～300%/10a	発病前～発病初期	散布	-	野菜類(かぼちゃ、ズッキーニを除く)
	バリアンシ液剤5	バリアンマイシ液剤	U18		500倍	100～300%/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	はくさい
根くびれ病	ダコソイル	TPN粉剤	M5		30～40kg/10a		は種又は定植前	作条施用土 壤混和	1回	はくさい
根こぶ病	ダコソイル	TPN粉剤	M5		10g/槽穴1穴		は種又は定植前	槽穴処理土 壤混和	1回	はくさい
					30～40kg/10a		は種又は定植前	全面施用土 壤混和	1回	はくさい
					30kg/10a		は種又は定植前	作条施用土 壤混和	1回	はくさい
	レビジン粉剤	フルスファミド粉剤	36		20～30kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混 和	1回	はくさい
					20kg/10a		は種又は定植前	作条土壌混 和	1回	はくさい
	フロアイト粉剤	フルアジナム粉剤	29		15～20kg/10a		は種又は定植前	作条土壌混 和	1回	はくさい
					30～40kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混 和	1回	はくさい
	ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	21		2000倍	250mL/株	収穫14日前まで	株元灌注	1回	はくさい
500倍					セル成型育苗トレイ4箱 またはペーパーポット1 冊(30×60cm、使用 土壌約2.5～7%)当 り2%	定植前日～当日	灌注	1回	はくさい	
白斑病	シグナムWDG	ビラクトロビン・シカリド水和剤	11,7		1500～2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	はくさい
	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
	ベンレート水和剤	ベンレート水和剤	1		2000～3000倍	100～300mL/m <sup>2</sup>	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
2000～3000倍					100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい	
べと病	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
アムシ	アタック乳剤	クロルフルアズロン乳剤	15		2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	はくさい
	オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	1B		1500～2000倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～ 2g/株)		定植時	槽穴処理	1回	はくさい
	コチフアロアブル	クロルフェニル水和剤	13	劇	2000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	はくさい
	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	1B		1500倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～ 2g/株)		定植時	槽穴処理	1回	はくさい
	ハクザップ水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	はくさい
	アロアブル	バリアンシ水和剤	UN		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
					16倍	1.6～3.2%/10a	収穫7日前まで	無人航空機 による散布	2回以内	はくさい
32倍					3.2%/10a	収穫7日前まで	無人航空機 による散布	2回以内	はくさい	

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名		
アムシ	ブレバ ソフアブ ル5	クロラントリリア ロール水和剤	28		100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1 冊(約30×60cm、使 用土壌約1.5～4%) 当り0.5%	育苗期後半～定植 当日	灌注	1回	はくさい		
					2000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	はくさい		
					20倍	1～2%/10a	収穫前日まで	無人航空機 による散布	3回以内	はくさい		
	ランネット45DF	ソリル水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300%/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	はくさい		
アブラムシ類	オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	1B		1500～2000倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい		
	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～ 2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい		
	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	1B		1500倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい		
	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～ 2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい		
	ベリマークSC	シアントリリア ロール水和剤	28		400倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1 冊(約30×60cm、使 用土壌約1.5～4%) 当り0.5%	育苗期後半～定植 当日	灌注	1回	はくさい		
	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000～3000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	はくさい		
コガ	アタブ ロン乳剤	クロルフルス ロン乳剤	15		2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	はくさい		
	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～1500倍	100～300%/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	はくさい		
	コファアブアル	クロルフェビ ル水和剤	13	劇	2000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	はくさい		
	トロフアブ ルCT	BT水和剤	11A		1000～2000倍		発生初期 但し 収穫 前日まで	散布	-	野菜類		
	ノモト乳剤	テフルソス ロン乳剤	15		2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい		
	バダソSG水溶剤	カルタップ 水溶剤	14	劇	1500倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	はくさい		
	アムシ	ブレバ ソフアブ ル5	クロラントリリア ロール水和剤	28		100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1 冊(約30×60cm、使 用土壌約1.5～4%) 当り0.5%	育苗期後半～定植 当日	灌注	1回	はくさい	
2000倍						100～300%/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	はくさい		
20倍						1～2%/10a	収穫前日まで	無人航空機 による散布	3回以内	はくさい		
ネキリムシ類	カルキス粉剤	イキザチオン粉剤	1B		6kg/10a		は種時又は植付時	土壌表面散 布土壌混和	1回	はくさい		
	デナポソ5%ベイト	NAC粒剤	1A		3～6kg/10a		収穫21日前まで	株元散布	3回以内	はくさい		
ハイダラメイガ	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～2000倍	100～300%/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	はくさい		
	コガ	アタブ ロン乳剤	クロルフルス ロン乳剤	15		2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	はくさい	
		オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	1B		1500倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい	
		オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～ 2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい	
		コファアブアル	クロルフェビ ル水和剤	13	劇	2000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	はくさい	
		ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	1B		1500倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい	
		ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～ 2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい	
		ハクザップ 水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300%/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	はくさい	
		アブ	アレキアブアル	ビリダリル水和剤	UN		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
							16倍	1.6～3.2%/10a	収穫7日前まで	無人航空機 による散布	2回以内	はくさい
32倍	3.2%/10a						収穫7日前まで	無人航空機 による散布	2回以内	はくさい		
	ランネット45DF	ソリル水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300%/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	はくさい		