（14）はくさい

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
黒斑病	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
軟腐病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
	ｽﾀｰﾅ水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤	31		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	はくさい
	ﾊﾞｲｵｷｰﾊﾟｰ水和剤	非病原性ｴﾙﾋﾞﾆｱ ｶﾛﾄﾎﾞｰﾗ水和剤	「-（生）」		500～2000倍	150～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病前～発病初期	散布	-	野菜類(かぼちゃ､ｽﾞｯｷｰﾆを除く)
	ﾊﾞﾘﾀﾞｼﾝ液剤5	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤	U18		500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	はくさい
根くびれ病	ﾀﾞｺｿｲﾙ	TPN粉剤	M5		30～40kg/10a		は種又は定植前	作条施用土壌混和	1回	はくさい
根こぶ病	ﾀﾞｺｿｲﾙ	TPN粉剤	M5		10g/植穴1穴		は種又は定植前	植穴処理土壌混和	1回	はくさい
					30～40kg/10a		は種又は定植前	全面施用土壌混和	1回	はくさい
					30kg/10a		は種又は定植前	作条施用土壌混和	1回	はくさい
	ﾈﾋﾞｼﾞﾝ粉剤	ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤	36		20～30kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混和	1回	はくさい
					20kg/10a		は種又は定植前	作条土壌混和	1回	はくさい
	ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ粉剤	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤	29		15～20kg/10a		は種又は定植前	作条土壌混和	1回	はくさい
					30～40kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混和	1回	はくさい
	ﾗﾝﾏﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤	21		2000倍	250mL/株	収穫14日前まで	株元灌注	1回	はくさい
					500倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(30×60cm､使用土壌約2.5～7ﾘｯﾄﾙ)当り2ﾘｯﾄﾙ	定植前日～当日	灌注	1回	はくさい
白斑病	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		1500～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	はくさい
	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
	ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤	ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤	1		2000～3000倍	100～300mL/㎡	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
					2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
べと病	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
ｱｵﾑｼ	ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	はくさい
	ｵﾙﾄﾗﾝ水和剤	ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤	1B		1500～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ｵﾙﾄﾗﾝ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい
	ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤	13	劇	2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	はくさい
	ｼﾞｪｲｴｰｽ水溶剤	ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤	1B		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ｼﾞｪｲｴｰｽ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい
	ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	はくさい
	ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ水和剤	UN		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
	ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		100倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	はくさい
					2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	はくさい
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	はくさい

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ｵﾙﾄﾗﾝ水和剤	ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤	1B		1500～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ｵﾙﾄﾗﾝ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい
	ｼﾞｪｲｴｰｽ水溶剤	ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤	1B		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ｼﾞｪｲｴｰｽ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい
	ﾍﾞﾘﾏｰｸSC	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	はくさい
	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	はくさい
ｺﾅｶﾞ	ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	はくさい
	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	はくさい
	ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤	13	劇	2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	はくさい
	ﾄｱﾛｰﾌﾛｱﾌﾞﾙCT	BT水和剤	11A		1000～2000倍		発生初期 但し 収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ﾉｰﾓﾙﾄ乳剤	ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
	ﾊﾟﾀﾞﾝSG水溶剤	ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤	14	劇	1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	はくさい
	ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		100倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	はくさい
					2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	はくさい
ﾈｷﾘﾑｼ類	ｶﾙﾎｽ粉剤	ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤	1B		6kg/10a		は種時又は植付時	土壌表面散布土壌混和	1回	はくさい
	ﾃﾞﾅﾎﾟﾝ5%ﾍﾞｲﾄ	NAC粒剤	1A		3～6kg/10a		収穫21日前まで	株元散布	3回以内	はくさい
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	はくさい
ﾖﾄｳﾑｼ	ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	はくさい
	ｵﾙﾄﾗﾝ水和剤	ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤	1B		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ｵﾙﾄﾗﾝ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい
	ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤	13	劇	2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	はくさい
	ｼﾞｪｲｴｰｽ水溶剤	ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤	1B		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	1回	はくさい
	ｼﾞｪｲｴｰｽ粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		定植時	植穴処理	1回	はくさい
	ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	はくさい
	ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ水和剤	UN		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	はくさい
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	はくさい