（７）本田除草剤の使用方法（移植）

RPA

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植初期剤	ｱｰｸｴｰｽ1ｷﾛ粒剤	0,15	1kg/10a	植代後～移植7日前または移植直後～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	かねつぐ1ｷﾛ粒剤	15,2	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ｼﾝｸﾞ乳剤	"18(F*),15	300mL/10a(少量散布)	移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	1回
	ｿﾙﾈｯﾄ1ｷﾛ粒剤	15	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ﾋﾟﾗｸﾛﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾍﾞｸｻｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	2回以内
			500mL/10a	植代後～移植前7日または移植直後～ﾉﾋﾞｴ発生始期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	2回以内
	ﾏｰｼｪｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ	15	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	植代後～移植前7日または移植後1日～ﾉﾋﾞｴ1葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾏｯﾄﾀﾌﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,30	5～10個(250～500g)/10a	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 但し、移植後30日まで	水田に投げ入れる。	1回
			5～10個(250～500g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 但し、移植後30日まで	水口施用	1回
	ﾒﾃｵ1ｷﾛ粒剤	14	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	2回以内
			1kg/10a	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	2回以内
	ﾒﾃｵｼﾞｬﾝﾎﾞ	14	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	植代後～移植前７日又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 但し、移植後30日まで	水口施用又は水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾒﾃｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14	500mL/10a	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	2回以内
			500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	2回以内
	兆ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
移植一発処理剤	ｱｶﾂｷ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布	1回
	ｱｶﾂｷｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱｶﾂｷﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	1回
	ｱｸｼｽﾞMX1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	湛水散布	1回
			1kg/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｱｸｼｽﾞMXｴｱｰ粒剤	2,27	300g/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	湛水散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ｱｸｼｽﾞMXｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱｼｭﾗ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱｼｭﾗ400FG	14,2,27	400g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱｼｭﾗｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱｼｭﾗﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植一発処理剤	ｱﾈｼｽ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱﾋﾟﾛｸﾞﾛｳMX1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ｲﾈｷﾝｸﾞ 1ｷﾛ粒剤	14,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｲﾈｾﾞｯﾄEW	14,15	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	植代後～移植前7日または移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	1回
	ｲﾈﾋｰﾛｰ1ｷﾛ粒剤	0,14,2	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｲﾈﾋｰﾛｰｴｱｰ粒剤	0,14,2	400g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｲﾈﾋｰﾛｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	0,14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期　ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｲﾈﾘｰｸﾞ 1ｷﾛ粒剤	15,27,4	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｳｨﾆﾝｸﾞﾗﾝ1ｷﾛ粒剤	15,2,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期但し、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｳﾙﾃｨﾓZ1ｷﾛ粒剤	2,27,33	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｳﾙﾃｨﾓZｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27,33	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(350g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｳﾙﾃｨﾓZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,33	500mL/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰ豆つぶ250	14,2,27	250g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｶﾁﾄﾞｷZ楽粒	2,4	250g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ｶﾞﾝｶﾞﾝ1ｷﾛ粒剤	15,2	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｶﾞﾝｶﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶﾞﾝｶﾞﾝ豆つぶ250	15,2	250g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植一発処理剤	ｷﾗﾘ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｷﾗﾘ400FG	14,2,27	400g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｷﾗﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｸﾗｰﾙEW	15,5	500mL/10a	植代後～移植7日前又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布	1回
	ｺﾞｴﾓﾝ1ｷﾛ粒剤	15,2,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｺﾞｴﾓﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｺﾞｴﾓﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,30	500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	1回
			500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｺﾒｯﾄ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｺﾒｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｺﾒｯﾄ顆粒	14,2,27	80g/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			80g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫60日前まで	顆粒水口施用	1回
			80g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ｻｷｶﾞｹ楽粒	15,27,4	250g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ｻｽｹ粒剤200	0,15,2,27	200g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ2葉期ただし、移植後30日まで	水口施用、湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ KAI1ｷﾛ粒剤	14,2,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ RXﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,30,4	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	1回
	ｼﾞｪｲｿｳﾙ1ｷﾛ粒剤	15,27,33	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼﾞｪｲｿｳﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,27,33	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(450g)/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼﾞｪｲｿｳﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,27,33	500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
			500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ 1ｷﾛ粒剤	30,14,27,3	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ 400FG	30,14,27,30	400g/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,14,27,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,14,27,30	500mL/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	1回
	ｼｸﾞﾅｽ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼｸﾞﾅｽｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼｸﾞﾅｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植一発処理剤	ｼﾞｬｽﾀ1ｷﾛ粒剤 ｸｻｳｪﾎﾟﾝ1ｷﾛ粒剤	2,27,33	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑMX1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑMX豆つぶ250	2,27	250g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼｭﾅｲﾃﾞﾝ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
		2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼｭﾅｲﾃﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼｭﾅｲﾃﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｼﾝｹﾞｷ1ｷﾛ粒剤	15,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
		15,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ｼﾝｹﾞｷｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼﾝｹﾞｷﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,27	500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
			500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｼﾝｽﾞｲZ1ｷﾛ粒剤	2,27,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼﾝｽﾞｲZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,30	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	1回
	ｼﾝｽﾞｲZ豆つぶ250	2,27,30	250g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ1ｷﾛ粒剤	2,27,4	1kg/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｾｲﾃﾝ1ｷﾛ粒剤	2,27,30,5	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀｼﾞｬｶﾞｰ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰ1ｷﾛ粒剤	14,2,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰ300FG	14,2,30	300g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,30	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｾﾞｰﾀﾊﾝﾏｰ1ｷﾛ粒剤	14,2	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	水口施用又は水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰSB顆粒	15,2,27	80g/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			80g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
			80g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	顆粒水口施用	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植一発処理剤	ﾀﾞﾝｸｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ SD	15,27,4	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾀﾞﾝｸｼｮｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,27,4	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾂｲｹﾞｷ1ｷﾛ粒剤	2,27,5	1kg/10a	移植後14日(稲5葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾂﾙｷﾞ 250粒剤	15,2,27	250g/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾂﾙｷﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期但し、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚ1ｷﾛ粒剤	2,27,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,30	500mL/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚ顆粒	2,27,30	80g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
			80g/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	顆粒水口施用	1回
	ﾃｯｼﾝ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾄﾞﾆﾁS1ｷﾛ粒剤	15,2,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ﾄﾞﾘﾌ1ｷﾛ粒剤	15,2,4	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾉｯｸｱｳﾄ楽粒	15,2,27,5	250g/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ﾉﾌﾞﾚｸﾄ乳剤	1,4	250mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	落水散布、ごく浅く湛水して散布、又は湛水散布	2回以内
	ﾊﾞｯﾁﾘ1ｷﾛ粒剤	14,2,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘ400FG	14,2,30	400g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘLX1ｷﾛ粒剤	14,2,30	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘLX400FG	14,2,30	400g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘLXｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,30	500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は水口施用	1回
			500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾊﾞｯﾄｳZ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾄｳZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、 移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾋﾞｸﾄﾘｰZ400FG	14,2	400g/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾋﾞｸﾄﾘｰZｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
	ﾋﾞｸﾄﾘｰZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2	500mL/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる滴下	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植一発処理剤	ﾌﾙｲﾆﾝｸﾞｽｶｲ500ｸﾞﾗﾑ粒剤	14,15,2,27	500g/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期但し収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾌﾙｽｺｱZ1ｷﾛ粒剤	「-」,2	1kg/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期但し収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾌﾙｽｺｱZｼﾞｬﾝﾎﾞ	「-」,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期但し収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾌﾙﾁｬｰｼﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾌﾙﾊﾟﾜｰMXｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装（ﾊﾟｯｸ）10個(500g)/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期但し収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾍﾞｯｶｸ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ﾍﾞｯｶｸｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾍﾞﾙｰｶﾞ 1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期但し、移植後30日まで	湛水散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾍﾞﾙｰｶﾞ ｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾍﾞﾙｰｶﾞ 豆つぶ250	2,27	250g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫75日前まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ﾎｯﾄｺﾝﾋﾞ 200粒剤	15,27	200g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ﾎｯﾄｺﾝﾋﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2葉期ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾏｽﾗｵ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾏｽﾗｵｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾏｽﾗｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ1ｷﾛ粒剤	14,2	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	2回以内
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ400FG	14,2	400g/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2	500mL/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる滴下	1回
	ﾗｲｼﾞﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,15,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾗｵｳ1ｷﾛ粒剤	0,15,2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	ﾚｵｾﾞｰﾀ1ｷﾛ粒剤	2,27,30	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布	1回
	ﾚｵｾﾞｰﾀﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,30	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植一発処理剤	ﾜｻﾞｱﾘ楽粒	15,27	250g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	銀河1ｷﾛ粒剤	0,14,2	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	銀河ｼﾞｬﾝﾎﾞ	0,14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	先陣200FG	14,5	200g/10a	植代後～移植7日前又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	先陣ｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,5	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	植代後～移植7日前又は移植直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	天空1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	天空ｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	天空ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	忍1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	忍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、移植後30日まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
			500mL/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	流星1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	移植時	田植同時散布機で施用	1回
	流星ｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	流星ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、移植後30日まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
移植中期剤	ｱﾄｶﾗSｼﾞｬﾝﾎﾞ MX	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)20個(500g)/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱﾄﾄﾘ1ｷﾛ粒剤	2	1kg/10a	移植後14日(稲5葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、 収穫45日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱﾄﾄﾘ豆つぶ250	2	250g/10a	移植後14日(稲5葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、 収穫45日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱﾚｲﾙSC	2	500mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	湛水散布又は落水散布	1回
	ｳｨｰﾄﾞｺｱ1ｷﾛ粒剤	2,27,4	1kg/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｳｨｰﾄﾞｺｱ200SD粒剤	2,27,4	200g/10a	移植後10日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｳｨｰﾄﾞｺｱｼﾞｬﾝﾎﾞ SD	2,27,4	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	移植後10日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
	ｸﾞﾗﾝｸﾛｽSｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27,33,5	小包装(ﾊﾟｯｸ)20個(500g)/10a	移植後14日(稲4葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｸﾞﾗﾝｸﾛｽZ1ｷﾛ粒剤	2,27,33,5	1kg/10a	移植後14日(稲4葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞ 1ｷﾛ粒剤	0,14,2,27	1kg/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞｷﾞｱ1ｷﾛ粒剤	2,27,33	1kg/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	0,14,2,27	小包装 (ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼｱｹﾞ MF1ｷﾛ粒剤	1,2,4	1kg/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ4.5葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｾｶﾝﾄﾞｼｮｯﾄSｼﾞｬﾝﾎﾞ MX	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)20個(500g)/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植中期剤	ﾂｲｹﾞｷ豆つぶ250	2,27,5	250g/10a	移植後14日(稲5葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾃｯｹﾝ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾃｯｹﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装（ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾆﾄｳﾘｭｳ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾆﾄｳﾘｭｳｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装（ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾊﾞｲｽｺｰﾌﾟ 1ｷﾛ粒剤	27,33	1kg/10a	移植後14～60日ただし、収穫45日前まで	湛水散布、ごく浅く湛水して散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾋｴｸｯﾊﾟｴｰｽ1ｷﾛ粒剤	2	1kg/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ5葉期但し収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
	ﾋｴｸﾘｰﾝﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤	2,6	3kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	ごく浅く湛水して散布	1回
			3kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	ごく浅く湛水して散布	1回
	ﾌﾞｲｺﾞｰﾙSM1ｷﾛ粒剤	2,4,5	1kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布	1回
	ﾚﾌﾞﾗｽ1ｷﾛ粒剤	0,2,27,5	1kg/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾚﾌﾞﾗｽｷﾞｱ1ｷﾛ粒剤	2,27,33	1kg/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾚﾌﾞﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ	0,2,27,5	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾜｲﾄﾞｱﾀｯｸSC	2	100mL/10a	移植後20日(稲5葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ6葉期 但し、収穫30日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰ粒剤	2,6	3kg/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
移植その他	ｶｳﾝｼﾙﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2	10mL/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	2回以内
	ｸﾘﾝﾁｬｰ1ｷﾛ粒剤	1	1kg/10a	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫30日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
			1.5kg/10a	移植後25日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫30日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
	ｸﾘﾝﾁｬｰEW	1	100mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ4.5葉期 但し、収穫30日前まで	無人航空機による散布	2回以内
			100mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ6葉期 但し、収穫30日前まで	湛水散布又は落水散布	2回以内
	ｸﾘﾝﾁｬｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	1	小包装(ﾊﾟｯｸ)30個(1.5kg)/10a	移植後25日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫30日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
			小包装(ﾊﾟｯｸ)20個	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫30日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
	ｸﾘﾝﾁｬｰﾊﾞｽME液剤	1,6	1000mL/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫50日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾄﾄﾞﾒMF1ｷﾛ粒剤	1	1kg/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ5葉期まで 但し、収穫50日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	3回以内
	ﾄﾄﾞﾒMF乳剤	1	200mﾘｯﾄﾙ/10a	移植後14日～ﾉﾋﾞｴ7葉期まで 但し、収穫50日前まで	湛水散布又は落水散布	2回以内
	ﾄﾄﾞﾒﾊﾞｽMF液剤	1,6	1000mL/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ6葉期 但し、収穫50日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾉﾐﾆｰ液剤	2	50～100mL/10a	移植後30日～ｸｻﾈﾑの草丈40cmまで 但し、収穫60日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
			50～100mL/10a	移植後30日～ｲﾎﾞｸｻの茎長30cmまで 但し、収穫60日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ・ｴｱｰ1ｷﾛ粒剤	6	1kg/10a	移植後15日～収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ液剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩)	6	500～700mL/10a	移植後15日～収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩)	6	3～4kg/10a	移植後15日～収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
	ﾋｴｸﾘｰﾝ1ｷﾛ粒剤	2	1kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ﾋｴｸﾘｰﾝ豆つぶ250	2	250g/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ﾏｲﾃｨｰﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	27	100mL/10a	移植直後～ﾎﾀﾙｲ3葉期 ただし、移植後30日まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	2回以内

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
移植 その他	ﾓｹﾞﾄﾝ粒剤	0	2～3kg/10a	ｳｷｸｻ類、藻類の発生始～発生盛期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	3回以内
			1～2kg/10a	藻類・表層はく離の発生時 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	3回以内
	ﾛｲﾔﾝﾄ乳剤	4	200mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	落水散布、ごく浅く湛水して散布又は湛水散布	2回以内
			200mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾜﾝｽﾃｰｼﾞ 1ｷﾛ粒剤	2	1kg/10a	移植後15日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	粒状水中MCP	4	3.0～3.5kg/10a	有効分けつ終止期～幼穂形成期前(但し収穫60日前まで)	湛水散布(あらかじめ水田の水の出入りをとめ、湛水のまま10a当り所要量を全面に均一散布する。)	1回