（9）いちご

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
萎黄病	ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤	ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤	1		500倍	-	仮植前	1～3時間苗根部浸漬	1回	いちご
					500倍	100mL/株	本圃定植後 但し、収穫30日前まで	灌注	1回	いちご
					500倍	50～100mL/株	育苗期	灌注	3回以内	いちご
うどんこ病	ｱﾌｪｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤	7		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	ｻﾝｸﾘｽﾀﾙ乳剤	脂肪酸ｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ乳剤	「-」		300～600倍	150～500ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	-	野菜類(なす、ﾄﾏﾄ、ﾐﾆﾄﾏﾄ、しゅんぎくを除く)
	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	ﾌﾙﾋﾟｶﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤	9		2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
					50倍	5ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	常温煙霧	3回以内	いちご
	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝAL水和剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*)		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫開始14日前まで	散布	3回以内	いちご
	ﾓﾚｽﾀﾝ水和剤	ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤	"UN(I*)		3000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
じゃのめ病	ﾄﾘﾌﾐﾝ水和剤	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤	3		3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	いちご
炭疽病	ｱﾝﾄﾗｺｰﾙ顆粒水和剤	ﾌﾟﾛﾋﾟﾈﾌﾞ水和剤	M3		500倍	150～300ﾘｯﾄﾙ/10a	仮植栽培期	散布	6回以内	いちご
	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ水和剤	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤	"UN(I*)		600倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	仮植栽培期 但し収穫76日前まで	散布	6回以内	いちご
	ｾｲﾋﾞｱｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ20	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤	12		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
灰色かび病	ｱﾌｪｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤	7		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		1500～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	ｽﾐﾚｯｸｽ水和剤	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤	2		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	ｾｲﾋﾞｱｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ20	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤	12		1000～1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	ﾌﾙﾋﾟｶﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤	9		2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝAL水和剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*)		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫開始14日前まで	散布	3回以内	いちご
	ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤	2		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	いちご
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ｴｺﾋﾟﾀ液剤	還元澱粉糖化物液剤	「-」		100倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	-	いちご
	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	いちご
ｲﾁｺﾞﾒｾﾝﾁｭｳ	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	育苗期	散布	4回以内	いちご
					1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	定植後生育初期	散布	4回以内	いちご
ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000～2000倍	2～3ﾘｯﾄﾙ/㎡	移植活着後(育苗期)	灌注	4回以内	いちご
ﾊﾀﾞﾆ類	ｶﾈﾏｲﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤	20B		1000～1500倍	150～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	1回	いちご
	ﾀﾞﾆｻﾗﾊﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｼﾌﾙﾒﾄﾌｪﾝ水和剤	25A		1000倍	100～350ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	ﾏｲﾄｺｰﾈﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤	20D		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご