（７）本田除草剤の使用方法（直播）

RPA

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
直播 初期剤	ﾌﾟﾚｷｰﾌﾟ1ｷﾛ粒剤	27	1kg/10a	湛水直播の代かき後～は種7日前またはは種直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期但し収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
	ﾌﾟﾚｷｰﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ	27	300～500mL/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			300～500mL/10a	湛水直播の代かき後～は種7日前またはは種直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期但し収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
直播 一発処理剤	ｱｶﾂｷ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布	1回
	ｱｶﾂｷｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱｶﾂｷﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ｱｸｼｽﾞMX1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
			1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	湛水散布	1回
	ｱｼｭﾗ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱｼｭﾗ400FG	14,2,27	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｱｼｭﾗｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱｼｭﾗﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｱﾋﾟﾛﾌｧｰｽﾄ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	湛水直播のは種直後～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	湛水直播のは種時	は種同時散布機で施用	1回
	ｲﾈｷﾝｸﾞ 1ｷﾛ粒剤	14,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｲﾈﾘｰｸﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,27,4	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｲﾈﾘｰｸﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,27,4	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ｳﾙﾃｨﾓZ1ｷﾛ粒剤	2,27,33	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｳﾙﾃｨﾓZｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27,33	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(350g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｳﾙﾃｨﾓZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,33	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫75日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ｴﾝﾍﾟﾗｰ豆つぶ250	14,2,27	250g/10a	稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｵｻｷﾆ1ｷﾛ粒剤	30,2,30	1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布、ごく浅く湛水して散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｶｲｼMF1ｷﾛ粒剤	1,27	1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	湛水直播のは種直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
直播 一発処理剤	ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｶﾗｯﾄ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｶﾗｯﾄ400FG	14,2,27	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｶﾗｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶﾞﾝｶﾞﾝ1ｷﾛ粒剤	15,2	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｶﾞﾝｶﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｶﾞﾝｶﾞﾝ豆つぶ250	15,2	250g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｷﾗﾘ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｷﾗﾘ400FG	14,2,27	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｷﾗﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	0,14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｺﾞｴﾓﾝ1ｷﾛ粒剤	30,15,2,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｺﾞｴﾓﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,15,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｺﾞｴﾓﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,15,2,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ｺﾒｯﾄ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｺﾒｯﾄ顆粒	14,2,27	80g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
			80g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫60日前まで	顆粒水口施用	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGO1ｷﾛ粒剤	30,14,2,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGO400FG	30,14,2,30	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGOｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGOﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,14,2,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞRXﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,2,30,4	500mL/10a	稲1.0葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ｼﾞｪｲｿｳﾙ1ｷﾛ粒剤	15,27,33	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼﾞｪｲｿｳﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,27,33	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(450g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼﾞｪｲｿｳﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,27,33	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
直播 一発処理剤	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ1ｷﾛ粒剤	30,14,27,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ400FG	30,14,27,30	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,14,27,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,14,27,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ｼﾞｶﾏｯｸ500ｸﾞﾗﾑ粒剤	2,27	500g/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
			500g/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
	ｼｸﾞﾅｽ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼｸﾞﾅｽｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼｸﾞﾅｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ｼﾞｬｽﾀ1ｷﾛ粒剤	2,27,33	1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
	ｼｭﾅｲﾃﾞﾝ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼｭﾅｲﾃﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｼｭﾅｲﾃﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ｼﾝｽﾞｲZ1ｷﾛ粒剤	2,27,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼﾝｽﾞｲZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ｼﾝｽﾞｲZ豆つぶ250	2,27,30	250g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ1ｷﾛ粒剤	2,27,4	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｾﾞｰﾀｼﾞｬｶﾞｰ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布	1回
	ｾﾞｰﾀｼﾞｬｶﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｾﾞｰﾀｼﾞｬｶﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰ1ｷﾛ粒剤	30,14,2,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰ300FG	30,14,2,30	300g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,14,2,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽ200FG	2,27	200g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫75日前まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫75日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰSB顆粒	15,2,27	80g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	顆粒水口施用	1回
			80g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
直播 一発処理剤	ﾀﾞﾝｸｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ SD	15,27,4	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾀﾞﾝｸｼｮｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,27,4	500mL/10a	湛水直播の稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ﾂﾙｷﾞ 250粒剤	15,2,27	250g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾂﾙｷﾞ ｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期但し、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚ1ｷﾛ粒剤	2,27,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ﾃﾞｨｵｰﾚ顆粒	2,27,30	80g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
			80g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	顆粒水口施用	1回
	ﾄﾞﾆﾁS1ｷﾛ粒剤	30,15,2,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ﾄﾞﾘﾌ1ｷﾛ粒剤	15,2,4	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾉｯｸｱｳﾄ楽粒	15,2,27,5	250g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 但し、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘ1ｷﾛ粒剤	30,14,2,30	1kg/10a	稲出芽始期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘ400FG	30,14,2,30	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘLX1ｷﾛ粒剤	30,14,2,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘLX400FG	30,14,2,30	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘLXｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ	30,14,2,30	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾊﾞｯﾁﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ	30,14,2,30	500mL/10a	稲出芽始期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は水口施用	1回
	ﾊﾞｯﾄｳZ1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾊﾞｯﾄｳZｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、 収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾊﾞｯﾄｳZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、 収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾋﾞｸﾄﾘｰZ400FG	14,2	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾋﾞｸﾄﾘｰZｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
	ﾋﾞｸﾄﾘｰZﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	原液湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる滴下	1回
	ﾌﾙﾁｬｰｼﾞ ｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾌﾙﾊﾟﾜｰMXｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期但し収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾍﾞｯｶｸ1ｷﾛ粒剤	15,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫75日前まで	湛水散布	1回
	ﾍﾞｯｶｸｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫75日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
直播 一発処理剤	ﾍﾞﾙｰｶﾞ1ｷﾛ粒剤	2,27	0.5～1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期　但し、収穫75日前まで	湛水散布	1回
			0.5～1kg/10a	は種直後	ごく浅く湛水して散布	1回
	ﾍﾞﾙｰｶﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(250g)/10a	稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫75日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾍﾞﾙｰｶﾞ 豆つぶ250	2,27	250g/10a	稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫75日前まで	湛水散布、水口施用又は無人航空機による散布	1回
	ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾏｽﾗｵ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布、ごく浅く湛水して散布又は無人航空機による散布	1回
			1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
	ﾏｽﾗｵｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾏｽﾗｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ1ｷﾛ粒剤	14,2	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ400FG	14,2	400g/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	2回以内
	ﾒｶﾞｾﾞｰﾀﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫60日前まで	原液湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる滴下	1回
	ﾗｲｼﾞﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,15,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾗｵｳ1ｷﾛ粒剤	0,15,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	湛水散布	1回
	ﾚｵｾﾞｰﾀ1ｷﾛ粒剤	2,27,30	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	湛水散布	1回
	ﾚｵｾﾞｰﾀﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,27,30	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布	1回
	ﾚﾌﾞﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ	0,2,27,5	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期ただし、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	天空ｼﾞｬﾝﾎﾞ	15,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	天空ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	15,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回
	忍1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(200g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	忍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	1回
	流星1ｷﾛ粒剤	14,2,27	1kg/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫90日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	流星ｼﾞｬﾝﾎﾞ	14,2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	流星ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	14,2,27	500mL/10a	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 ただし、収穫90日前まで	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	1回

区分	薬剤名	RAC	希釈倍数使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
直播 稲２葉期以降処理剤	ｱﾄｶﾗSｼﾞｬﾝﾎﾞ MX	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)20個(500g)/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ｱﾚｲﾙSC	2	500mL/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	湛水散布又は落水散布	1回
	ｳｨｰﾄﾞｺｱ1ｷﾛ粒剤	2,27,4	1kg/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、 収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞ 1ｷﾛ粒剤	0,14,2,27	1kg/10a	稲2葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ｼｱｹﾞ MF1ｷﾛ粒剤	1,2,4	1kg/10a	稲3.5葉期～ﾉﾋﾞｴ4.5葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内
	ｾｶﾝﾄﾞｼｮｯﾄSｼﾞｬﾝﾎﾞ MX	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)20個(500g)/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 ただし、収穫45日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾂｲｹﾞｷ1ｷﾛ粒剤	2,27,5	1kg/10a	稲5葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾂｲｹﾞｷ豆つぶ250	2,27,5	250g/10a	稲5葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾃｯｹﾝ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、 収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾃｯｹﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾄﾄﾞﾒMF1ｷﾛ粒剤	1	1kg/10a	稲3.5葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期まで 但し、収穫50日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	3回以内
	ﾄﾄﾞﾒMF乳剤	1	200mﾘｯﾄﾙ/10a	は種後10日～ﾉﾋﾞｴ6葉期まで 但し、収穫50日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
	ﾄﾄﾞﾒﾊﾞｽMF液剤	1,6	1000mL/10a	は種後10日～ﾉﾋﾞｴ6葉期 但し、収穫50日前まで	乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
	ﾆﾄｳﾘｭｳ1ｷﾛ粒剤	2,27	1kg/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、 収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾆﾄｳﾘｭｳｼﾞｬﾝﾎﾞ	2,27	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(500g)/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期但し、収穫60日前まで	水田に小包装(ﾊﾟｯｸ)のまま投げ入れる。	1回
	ﾉﾌﾞﾚｸﾄ乳剤	1,4	250mL/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
	ﾊﾞｲｽｺｰﾌﾟ 1ｷﾛ粒剤	27,33	1kg/10a	稲3葉期～出芽後50日ただし、収穫45日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾋｴｸﾘｰﾝﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤	2,6	3kg/10a	ｲﾈ3葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期但し、収穫60日前まで	ごく浅く湛水して散布	1回
	ﾚﾌﾞﾗｽ1ｷﾛ粒剤	0,2,27,5	1kg/10a	稲2葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫60日前まで	湛水散布又は無人航空機による散布	1回
	ﾛｲﾔﾝﾄ乳剤	4	200mL/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期 ただし、収穫45日前まで	乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
	ﾜｲﾄﾞｱﾀｯｸSC	2	100mL/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
			100mL/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫30日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰ粒剤	2,6	3kg/10a	稲4葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
	銀河1ｷﾛ粒剤	0,14,2	1kg/10a	稲2葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期ただし、収穫60日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
直播 その他	ｸﾘﾝﾁｬｰ1ｷﾛ粒剤	1	1kg/10a	は種後10日～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫30日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
			1.5kg/10a	は種後25日～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫30日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	2回以内
	ｸﾘﾝﾁｬｰEW	1	100mL/10a	は種後10日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
			100mL/10a	は種後10日～ﾉﾋﾞｴ4.5葉期 但し、収穫30日前まで	無人航空機による散布	2回以内
	ｸﾘﾝﾁｬｰﾊﾞｽME液剤	1,6	1000mL/10a	は種後10日～ﾉﾋﾞｴ5葉期 但し、収穫50日前まで	乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布	2回以内
	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ液剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩)	6	500～700mL/10a	は種後35日～収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
	ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩)	6	3kg/10a	稲3葉期～収穫45日前まで	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
	ﾋｴｸﾘｰﾝ1ｷﾛ粒剤	2	1kg/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
			1kg/10a	は種直後～稲出芽前	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回
			0.5～1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
	ﾋｴｸﾘｰﾝ豆つぶ250	2	250g/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
	ﾓｹﾞﾄﾝ粒剤	0	1.5～2kg/10a	稲1葉期以降、ｱｵﾐﾄﾞﾛ、表層はく離発生時 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	3回以内
	ﾜﾝｽﾃｰｼﾞ 1ｷﾛ粒剤	2	1kg/10a	稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期 但し、収穫45日前まで	湛水散布又は無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布	1回
			0.5～1kg/10a	は種時	は種同時散布機で施用	1回
			1kg/10a	は種直後～稲出芽前	落水散布又はごく浅く湛水して散布	1回