

(8) かぼちゃ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
疫病	ジマンダ イオン水和剤	マンベア 水和剤	"UN(*)		600倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	かぼちゃ
うどんこ病	シグナムWDG	ビラロストロピンホスカリド 水和剤	11,7		1500～2000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	かぼちゃ
	バンチオTF顆粒水和剤	シフルフェナミド・トリフルミゾール水和剤	3,U6		2000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	かぼちゃ
	モレスタン水和剤	キキリン系水和剤	"UN(*)		2000～4000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	かぼちゃ
べと病	ジマンダ イオン水和剤	マンベア 水和剤	"UN(*)		600倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	かぼちゃ
アブラムシ類	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000～3000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
	マラソン粉剤3	マラソン粉剤	1B		3kg/10a		収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
カハムシ	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
カハムシ幼虫	ダ イアジノン粒剤3	ダ イアジノン粒剤	1B		6～9kg/10a		植付時	土壌混和	1回	かぼちゃ
タネハエ	ダ イアジノン粒剤3	ダ イアジノン粒剤	1B		5～8kg/10a		は種時又は植付時	土壌混和	2回以内	かぼちゃ
ハダニ類	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000～3000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
	マラソン粉剤3	マラソン粉剤	1B		3kg/10a		収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ