（８）かぼちゃ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
疫病	ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ水和剤	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤	"UN(I*)		600倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	かぼちゃ
うどんこ病	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		1500～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	かぼちゃ
	ﾊﾟﾝﾁｮTF顆粒水和剤	ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ・ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤	3,U6		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	かぼちゃ
	ﾓﾚｽﾀﾝ水和剤	ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤	"UN(I*)		2000～4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	かぼちゃ
べと病	ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ水和剤	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤	"UN(I*)		600倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	かぼちゃ
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
	ﾏﾗｿﾝ粉剤3	ﾏﾗｿﾝ粉剤	1B		3kg/10a		収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
ｳﾘﾊﾑｼ	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
ｳﾘﾊﾑｼ幼虫	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤3	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤	1B		6～9kg/10a		植付時	土壌混和	1回	かぼちゃ
ﾀﾈﾊﾞｴ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤3	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤	1B		5～8kg/10a		は種時又は植付時	土壌混和	2回以内	かぼちゃ
ﾊﾀﾞﾆ類	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ
	ﾏﾗｿﾝ粉剤3	ﾏﾗｿﾝ粉剤	1B		3kg/10a		収穫前日まで	散布	5回以内	かぼちゃ