

(12) かぶ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
根こぶ病	ダコソイル	TPN粉剤	M5		20~40kg/10a		は種前	作条施用土 壤混和	1回	かぶ
	ネビジン粉剤	フルスルファミド粉剤	36		20kg/10a		は種又は定植前	作条土壌混 和	1回	かぶ
					30kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混 和	1回	かぶ
	フロンサイド粉剤	フルアジナム粉剤	29		30~40kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混 和	1回	かぶ
アムシ	トアローアブールCT	BT水和剤	11A		1000~2000倍		発生初期 但し 収穫 前日まで	散布	-	野菜類
	マラソン乳剤50	マラソン乳剤	1B		1000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	かぶ
アムシ類	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000~3000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	かぶ
カブラハチ	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000倍	100~300%/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	かぶ
キジミハムシ	ハチハチ乳剤	トルフェンビラド乳剤	"21A(I*)	劇	2000倍	100~300%/10a	収穫7日前まで	散布	1回	かぶ
	フォース粒剤	テフトリン粒剤	3A	劇	4kg/10a		は種時	播溝土壌混 和	1回	かぶ
	モスビラン顆粒水溶剤	アセタグリド水溶剤	4A	劇	2000倍	100~300%/10a	収穫21日前まで	散布	1回	かぶ
コガ	トアローアブールCT	BT水和剤	11A		1000~2000倍		発生初期 但し 収穫 前日まで	散布	-	野菜類
ハイマダラメイガ	ハチハチ乳剤	トルフェンビラド乳剤	"21A(I*)	劇	2000倍	100~300%/10a	収穫7日前まで	散布	1回	かぶ
ヨウムシ	トアロー水和剤CT	BT水和剤	11A		500~1000倍	100~300%/10a	発生初期 但し 収穫 前日まで	散布	-	野菜類(ハ チ、えご ま(葉)を 除く)