２　花き除草剤

(1) 使用上の注意事項

① 使用薬量は、散布実面積当りの量を厳守する。
② 土壌処理剤は、整地後または畦立後表土を均平にし、土壌表面に均一に散布する。
③ 粘土質の透水の悪い圃場では、薬量を減らす。砂質地は薬効が少なく、薬害が出易いので注意する。
④ 土壌処理後、敷わら、もみがらマルチの併用は抑草効果を高める。
⑤ マルチ、トンネル、ハウスでは薬害が出易いので、薬量を少なめにする。また、極端な高温乾燥時は散布しないようにする。
⑥ 散布にあたっては、除草剤専用の散布器具を使用し、噴口は必ずフード付きのものを使用する。
⑦ 散布にあたっては、メガネ、マスク、防除衣、手袋などを必ず着用する。

(2) 使用方法

作物名	除草剤名	適用雑草名	使用基準		10アール当たり使用量		注意事項
			時期	回数	薬量	希釈水量	
ユリ	トレファノサイド乳剤 トリフルラリン 44.5% カット	一年生雑草 (ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	植付後～萌芽前	1	200～300 ml	100 ℓ	＜全面土壌散布＞ ・散布は均一に、または夕方や曇った日に実施する。 ・土壌が乾燥している場合、土壌を適当に湿らせるか、あるいは降雨後に散布する。
スイセン			萌芽前	1	200～300 ml	100 ℓ	
キク (露地栽培)			定植後	1	200～300 ml	100 ℓ	＜畦間土壌散布＞ ・露地栽培に限る。 ・マルチ、トンネル栽培では、薬害の恐れがある。
スイセン	プリグロックスL ジクワット 7.0% パラコート 5.0% 毒	一年生雑草	萌芽前 (雑草生育期)	3	600～1,000 ml	100～150 ℓ	＜雑草茎葉散布＞ ・医薬用外毒物。取扱いには、特に注意する。 ・有用作物に、飛散させない。
			畦間処理: 雑草生育期 (草丈20cm以下)				
花き類・観葉植物(チューリップ、スイセンを除く)			畦間処理: 雑草生育期 (草丈20cm以下)	3	600～1,000 ml	100～150 ℓ	
キク	ゴーゴーサン乳剤 ペンディメタリン 30.0%	一年生雑草	定植前 (雑草発生前) 定植後 (雑草発生前)	1	200～400 ml	70～150 ℓ	＜全面土壌散布＞ ・キク科雑草とツユクサには、効果が劣る。 ・土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、希釈水量を多めにするか降雨後に散布する。

作物名	除草剤名	適用雑草名	使用基準		10アール当たり使用量		注意事項
			時期	回数	薬量	希釈水量	
キク	ナブ乳剤 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ 20.0%	一年生イネ科雑草 (ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5葉期	3	150～200 ml	100～150 ℓ	＜雑草茎葉散布又は全面散布＞ ・効果が発現するまでに、7～10日を要する。 ・広葉雑草およびカヤツリグサ科には、効果がない。
樹木類	ナブ乳剤 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ 20.0%	一年生イネ科雑草 (ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5葉期	3	150～200 ml	100 ℓ	＜雑草茎葉散布又は全面散布＞
	バスタ液剤 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ 18.5%	一年生雑草	雑草生育期	3	300～500 ml	100～150 ℓ	＜雑草茎葉散布＞
樹木等 公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道など	プリグロックスL ｼﾞｸﾜｯﾄ 7.0% ﾊﾟﾗｺｰﾄ 5.0% 劇	一年生雑草	雑草生育期	3	800～1,000 ml	100～150 ℓ	＜雑草茎葉散布＞ ・医薬用外毒物。取扱いには、特に注意する。 ・植栽地を除く樹木等の周辺地。
		多年生雑草			1,500～2,000 ml		
		スギナ	ｽｷﾞﾅ生育期		1,000～2,000 ml		
	バスタ液剤 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ 18.5%	一年生雑草	雑草生育期	3	500～1,000 ml	100～200 ℓ	＜雑草茎葉散布＞ ・植栽地を除く樹木等の周辺地。
		多年生雑草			1,000～2,000 ml		
	タッチダウン iQ ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩 44.7%	一年生雑草	雑草生育期	3	250～500 ml	10～100ℓ	＜雑草茎葉散布＞ ・植栽地を除く樹木等の周辺地。
		多年生雑草			500～1,000 ml		
		スギナ	雑草生育期		1,500～2,000 ml	25～100ℓ	
		ススキ、クズ	雑草生育期		1,000～2,000 ml	50～100ℓ	
		ササ類	雑草生育期				
		雑かん木	雑草生育期			25～100ℓ	
	ラウンドアップ マックスロード ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩 48.0%	一年生雑草	雑草生育期	3	200～500 ml	通常散布 50～100 ℓ 少量散布 25～50 ℓ	＜雑草木茎葉散布＞ ・植栽地を除く樹木等の周辺地。
		多年生雑草			500～1,000 ml		
		一年生及び多年生雑草				少量散布 5～25 ℓ	
		スギナ			1,500～2,000 ml	通常散布 50～100 ℓ 少量散布 25～50 ℓ	
		ススキ、ヒレハリソウ、クズ等のつる性多年生雑草、ササ類、雑かん木			1,000～2,000 ml		
	カソロン粒剤 4.5 DBN 4.5%	一年生雑草、多年生広葉雑草	雑草発生前～発生始期	3	8～12 kg		＜全面土壌散布＞ ・植栽地を除く樹木等の周辺地。
		スギナ			8～15 kg		