

(6) メロン

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
うどんこ病	ジ-フアイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・銅水和剤	M1,NC		750~1000倍	150~500g/10a	収穫前日まで	散布	-	野菜類(なすを除く)
	トリフィン水和剤	トリフルゼノール水和剤	3		3000~5000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	メロン
	バレード 2070アブル	ピラジフルミド水和剤	7		2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	うり類(成熟)
	パンチョTF顆粒水和剤	シフルフェナミド・トリフルゼノール水和剤	3,U6		2000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	メロン
	アセキイト フロアブル	イミダクワジノールヘキシル硫酸塩・ピリダクロメチル水和剤	53,M7		1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	メロン
	ベジセイバー	ベンチオビラト・TPN水和剤	7,M5		1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	メロン
	モルスタン水和剤	キチリチン系水和剤	"UN(I*)		100g/10a	5g/10a	収穫3日前まで	常温煙霧	10回以内	メロン
				2000~4000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	10回以内	メロン	
疫病	ジマンダ イセク水和剤	マンゼブ水和剤	"UN(I*)		400~600倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	メロン
菌核病	バレード 2070アブル	ピラジフルミド水和剤	7		2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	うり類(成熟)
つる枯病	ジマンダ イセク水和剤	マンゼブ水和剤	"UN(I*)		400~600倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	メロン
	ダユニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	メロン
	トップジンMベスト	チオファネトメチルベスト剤	1		原液		発病初期 但し、収穫21日前まで	塗布	1回	メロン
	バレード 2070アブル	ピラジフルミド水和剤	7		2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	うり類(成熟)
	アセキイト フロアブル	イミダクワジノールヘキシル硫酸塩・ピリダクロメチル水和剤	53,M7		1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	メロン
	ロブラル水和剤	イプロジオン水和剤	2		1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	メロン
斑点細菌病	ゾボルト-	銅水和剤	M1		500倍	100~300g/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
	カスミンボルト-	カスカイシン・銅水和剤	24,M1		1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	メロン
	コサイドボルト-	銅水和剤	M1		1000倍		-	散布	-	野菜類
べと病	ジマンダ イセク水和剤	マンゼブ水和剤	"UN(I*)		400~600倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	メロン
	ダユニール1000	TPN水和剤	M5		700~1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	メロン
	ベトファイター顆粒水和剤	シメキシル・ベンチアバリカルブイプロピル水和剤	27,40		2000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	メロン
アブラムシ類	カリナ水和剤40	アラムカルブ水和剤	1A	劇	1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	メロン
	サンマイトフロアブル	ピリダベンズ水和剤	21A	劇	1000~1500倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	メロン
	ダントツ粒剤	クロチアジン粒剤	4A		1~2g/株		育苗期後半	株元処理	1回	メロン
					1~2g/株		定植後 但し、収穫前日まで	株元散布	3回以内	メロン
					1~2g/株		定植時	植穴処理 土壌混和	1回	メロン
	アリゾツ粒剤ホカ	シアントラネリブロール粒剤	28		2g/株		育苗期後半~定植時	株元散布	1回	メロン
	ベストガード 粒剤	ニテンピラム粒剤	4A		1~2g/株		定植時	植穴処理±1回	メロン	
				1g/株		育苗期	株元処理	1回	メロン	
カリメカ	カリナ水和剤40	アラムカルブ水和剤	1A	劇	1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	メロン
カリハシ	マリン乳剤	マリン乳剤	1B		1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	メロン
コナジラミ類	ダントツ粒剤	クロチアジン粒剤	4A		1~2g/株		育苗期後半	株元処理	1回	メロン
					1~2g/株		定植時	植穴処理 土壌混和	1回	メロン
	ベストガード 粒剤	ニテンピラム粒剤	4A		1~2g/株		定植時	植穴処理 土壌混和	1回	メロン
				1g/株		育苗期	株元処理	1回	メロン	
タネバエ	ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤	1B		5~8kg/10a		は種時又は植付時	土壌混和	2回以内	メロン
トマトモグリバエ	ダントツ粒剤	クロチアジン粒剤	4A		2g/株		定植時	植穴処理 土壌混和	1回	メロン
ネコセンチュウ	ネマキック粒剤	イミダス粒剤	1B		15~20kg/10a		定植前	全面土壌 混和	1回	メロン

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
ミミキイロアザミヤカ	ダントツ粒剤	加チアジソン粒剤	4A		2g/株		定植時	植穴処理 土壌混和	1回	メロン
	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	4A		1~2g/株		定植時	植穴処理 土壌混和	1回	メロン