（22）にんじん

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
黒葉枯病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～800倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	にんじん
	ｺｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		1000倍		-	散布	-	にんじん
	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	にんじん
	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝAL水和剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*)		500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	にんじん
軟腐病	ｺｻｲﾄﾞ3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類
	ｽﾀｰﾅ水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤	31		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	にんじん
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	にんじん
ｷｱｹﾞﾊ	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	にんじん
	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	にんじん
ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ	ﾈﾏｷｯｸ粒剤	ｲﾐｼｱﾎｽ粒剤	1B		10～15kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	にんじん
	ﾈﾏｸﾘｰﾝ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	にんじん
	ﾋﾞｰﾗﾑ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	にんじん
ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ	ﾈﾏｸﾘｰﾝ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	にんじん
	ﾋﾞｰﾗﾑ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	にんじん
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	にんじん
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	にんじん
ﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ類	ｱｸｾﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ水和剤	22B		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	にんじん
ﾖﾄｳﾑｼ	ｶｽｹｰﾄﾞ乳剤	ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤	15		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	にんじん
	ｾﾞﾝﾀｰﾘ顆粒水和剤	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300L/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類(キャベツ、はくさいを除く)
	ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	にんじん
	ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	ﾒｿﾐﾙ水和剤	1A	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	にんじん