

## (20) にんにく

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
さび病	アミスター2070アブル	アゾキシストロビン水和剤	11		2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	にんにく
					20倍	1.6%/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内	にんにく
	シグナムWDG	ビラクトロビン・ホスカリド水和剤	11,7		1500倍	100～300%/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	にんにく
	ストロビ70アブル	クレキシムゲル水和剤	11		2000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	にんにく
8倍					0.8%/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内	にんにく	
16倍					1.6%/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内	にんにく	
				32倍	3.2%/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内	にんにく	
葉枯病	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300%/10a	収穫7日前まで	散布	6回以内	にんにく
春腐病	コサイド3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300%/10a	-	散布	-	にんにく