（19）らっきょう

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
乾腐病	ﾃﾞｨ･ﾄﾗﾍﾞｯｸｽ油剤	ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤	「-」→8A,「-」→8F,8A,8F	劇	30～40ﾘｯﾄﾙ/10a		は種又は植付の21日前まで	圃場を耕起･整地した後､所定量を深さ約12～15cmに注入し､直ちに覆土･鎮圧する。薬剤処理7～14日後にｶﾞｽ抜き作業を行う。	1回	らっきょう
	ﾄﾘﾌﾐﾝ水和剤	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤	3		50倍	-	植付前	5～30分間種球浸漬	1回	らっきょう
	ﾍﾞﾝﾚｰﾄT水和剤20	ﾁｳﾗﾑ･ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤	1,M3		200倍	-	植付前	30分間種球浸漬	1回	らっきょう
	ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤	ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤	1		500倍	-	植付直前	30分間種球浸漬	1回	らっきょう
白色疫病	ﾌｫﾘｵｺﾞｰﾙﾄﾞ	ﾒﾀﾗｷｼﾙM･TPN水和剤	4,M5		1000倍	100～400ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	らっきょう
	ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ水和剤	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤	29		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	らっきょう
	ﾍﾞﾄﾌｧｲﾀｰ顆粒水和剤	ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ水和剤	27,40		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	らっきょう
さび病	ｱﾐｽﾀｰ20ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤	11		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	らっきょう
灰色かび病	ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ水和剤	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤	29		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	らっきょう
	ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤	2		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫30日前まで	散布	3回以内	らっきょう
ﾈﾀﾞﾆ	ﾈﾏﾄﾘﾝｴｰｽ粒剤	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤	1B		15kg/10a		植付前	植溝土壌混和	1回	らっきょう
ﾈﾀﾞﾆ類	ﾄｸﾁｵﾝ細粒剤F	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ粉粒剤	1B		6kg/10a		定植時	植溝土壌混和	1回	らっきょう
	ﾌｫｰｽ粒剤	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤	3A	劇	6～9kg/10a		収穫14日前まで	株元散布	1回	らっきょう
					9kg/10a		定植前	植溝土壌混和	1回	らっきょう
					9kg/10a		定植前	全面土壌混和	1回	らっきょう