（21）レタス・非結球レタス

レタス

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
菌核病	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾚﾀｽ
	ｽﾐﾚｯｸｽ水和剤	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤	2		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	ﾚﾀｽ
	ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝM水和剤	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤	1		1500～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾚﾀｽ
					1500倍	1.5ﾘｯﾄﾙ/㎡	収穫45日前まで	灌注	1回	ﾚﾀｽ
	ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤	ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤	1		2000～3000倍	100～300mL/㎡	収穫14日前まで	散布	4回以内	ﾚﾀｽ
					2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	ﾚﾀｽ
	ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤	2		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	ﾚﾀｽ
黒腐病	ｺｻｲﾄﾞ3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類
すそ枯病	ｼｸﾞﾅﾑWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤	11,7		1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	ﾚﾀｽ
	ﾊﾞﾘﾀﾞｼﾝ液剤5	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤	U18		800倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	ﾚﾀｽ
	ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ粉剤	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤	29		30kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混和	1回	ﾚﾀｽ
軟腐病	ｺｻｲﾄﾞ3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類
灰色かび病	ｽﾐﾚｯｸｽ水和剤	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤	2		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	ﾚﾀｽ
	ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤	2		1000～1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	ﾚﾀｽ
腐敗病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～800倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	ﾚﾀｽ
べと病	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	ﾚﾀｽ
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ	ﾍﾞﾘﾏｰｸSC	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	ﾚﾀｽ
ﾈｷﾘﾑｼ類	ｶﾙﾎｽ微粒剤F	ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤	1B	劇	6kg/10a		は種時又は植付時	土壌表面散布土壌混和	2回以内	ﾚﾀｽ
	ｶﾙﾎｽ粉剤	ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤	1B		6kg/10a		は種時又は植付時	土壌表面散布土壌混和	2回以内	ﾚﾀｽ
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤3	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤	1B		6～9kg/10a		は種時又は植付時	土壌混和	2回以内	ﾚﾀｽ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	ﾚﾀｽ
	ﾍﾞﾘﾏｰｸSC	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm､使用土壌約1.5～4ﾘｯﾄﾙ)当り0.5ﾘｯﾄﾙ	育苗期後半～定植当日	灌注	1回	ﾚﾀｽ
ﾖﾄｳﾑｼ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	ﾚﾀｽ

非結球レタス

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
黒腐病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
軟腐病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)
腐敗病	Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ	銅水和剤	M1		500～800倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	-	非結球ﾚﾀｽ
ﾈｷﾘﾑｼ類	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤5	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤	1B		6kg/10a		は種時又は定植時	全面土壌混和又は作条土壌混和	2回以内	非結球ﾚﾀｽ