（28）さといも

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
疫病	ｱﾐｽﾀｰ20ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤	11		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	さといも
	ｶﾝﾊﾟﾈﾗ水和剤 ﾍﾞﾈｾｯﾄ水和剤	ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ・ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤	"UN(I*),40		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	さといも
	ｼﾞｰﾌｧｲﾝ水和剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・銅水和剤	M1,NC		1000倍	150～500ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	-	さといも
	ﾀﾞｲﾅﾓ顆粒水和剤	ｱﾐｽﾙﾌﾞﾛﾑ・ｼﾓｷｻﾆﾙ水和剤	21,27		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	さといも
	ﾋﾟｼﾛｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟｶﾙﾌﾞﾄﾗｿﾞｸｽ水和剤	U17		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	さといも
	ﾗﾝﾏﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤	21		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	さといも
黒斑病	ﾍﾞﾝﾚｰﾄT水和剤20	ﾁｳﾗﾑ・ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤	1,M3		20倍	-	植付前	1分間種いも浸漬	1回	さといも
					種いも重量の0.4～0.5%	-	植付前	種いも粉衣	1回	さといも
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ1粒剤	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤	4A		4kg/10a		植付時	植溝土壌混和	1回	さといも
					4kg/10a		植付時	植溝土壌混和	1回	さといも(葉柄)
	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	1回	さといも
ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ	ﾋﾟﾗﾆｶEW	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤	"21A(I*)	劇	2000倍	150～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	1回	さといも
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	1回	さといも
	ｴﾙｻﾝ粉剤2	PAP粉剤	1B		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	1回	さといも
	ｾﾞﾝﾀｰﾘ顆粒水和剤	BT水和剤	11A		1000倍	100～300L/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類(キャベツ、はくさいを除く)
	ﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤	3A		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	さといも
					1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	さといも(葉柄)
	ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ水和剤	UN		1000～2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	さといも
	ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤	28		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	さといも
ﾊﾀﾞﾆ類	ﾏｲﾄｺｰﾈﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤	20D		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫3日前まで	散布	1回	さといも
ﾈｸﾞｻﾚﾝﾁｭｳ	ﾈﾏｷｯｸ粒剤	ｲﾐｼｱﾎｽ粒剤	1B		20kg/10a		植付前	全面土壌混和	1回	さといも
	ﾈﾏｸﾘｰﾝ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*		20kg/10a		植付前	全面土壌混和	1回	さといも
	ﾋﾟｰﾗﾑ粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ粒剤	"「-」(I*		20kg/10a		植付前	全面土壌混和	1回	さといも