（4）そば薬剤一覧

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ｾﾞﾝﾀｰﾘ顆粒水和剤	BT水和剤	11A		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
	ﾛﾑﾀﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤	18		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内
	ﾛﾑﾀﾞﾝ粉剤DL	ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ粉剤	18		4kg/10a		収穫21日前まで	散布	2回以内
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ雄成虫	ﾌｪﾛﾃﾞｨﾝSL	ﾘﾄﾙｱ剤				2～4個/ha	成虫発生初期から発生終期まで	本剤をﾄﾗｯﾌﾟ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5～2ヵ月間隔で更新する。	

（5）あずき薬剤一覧

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
ｱｽﾞｷﾉﾒｲｶﾞ	ｴﾙｻﾝ乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内
	ﾏﾗｿﾝ粉剤3	ﾏﾗｿﾝ粉剤	1B		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
ﾊﾀﾞﾆ類	ﾏﾗｿﾝ乳剤	ﾏﾗｿﾝ乳剤	1B		1000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内
	ﾏﾗｿﾝ粉剤3	ﾏﾗｿﾝ粉剤	1B		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内