

(25) とうもろこし

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
アブラムシ類	アグロシリン乳剤	シベメトリン乳剤	3A	劇	1000~2000倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	とうもろこし
	アデイオン乳剤	ベメトリン乳剤	3A		2000~3000倍	100~300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
アブラメイガ	アグロシリン乳剤	シベメトリン乳剤	3A	劇	1000~2000倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	とうもろこし
	アデイオン乳剤	ベメトリン乳剤	3A		2000倍	100~300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100~300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
	ベネビアOD	シアントラリア ロール水和剤	28		2000~4000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	未成熟とうもろこし
				40倍	2~3.2L/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内	未成熟とうもろこし	
アブラコト	トボシ乳剤	エトフェンブ ロックス乳剤	3A		1000倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
ネキリムシ類	ガードベイトA	ベメトリン粒剤	3A		3kg/10a		生育初期	株元散布	4回以内	とうもろこし