

(25) どうもろこし

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
アブラムシ類	アゲロシン乳剤	シハルメトリン乳剤	3A	劇	1000~2000倍	100~300 μ g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	どうもろこし
	アゲイオン乳剤	ヘルメトリン乳剤	3A		2000~3000倍	100~300 μ g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	どうもろこし
アノメカ	アゲロシン乳剤	シハルメトリン乳剤	3A	劇	1000~2000倍	100~300 μ g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	どうもろこし
	アゲイオン乳剤	ヘルメトリン乳剤	3A		2000倍	100~300 μ g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	どうもろこし
	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100~300 μ g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	どうもろこし
	ベネビアOD	シアントラニリア ロール水和剤	28		2000~4000倍	100~300 μ g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	未成熟どうもろこし
アヲトウ	トレボロン乳剤	エトフェンブ ロックス乳剤	3A		1000倍	100~300 μ g/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	どうもろこし
ネキリムシ類	ガードベイトA	ヘルメトリン粒剤	3A		3kg/10a		生育初期	株元散布	4回以内	どうもろこし