

## (29) やまのいも

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
青かび病	ベルカトフロアブル	イミダゾリルベシル酸塩水和剤	M7		200倍	-	植付前	1～10分間種 いも浸漬	1回	やまのい も
炭疽病	ジマンダ イオン水和剤	マンベア 水和剤	"UN(I*)		400～600倍	100～300%/10a	収穫21日前まで	散布	4回以内	やまのい も
	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	6回以内	やまのい も
葉洗病	ジマンダ イオン水和剤	マンベア 水和剤	"UN(I*)		400～600倍	100～300%/10a	収穫21日前まで	散布	4回以内	やまのい も
	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300%/10a	収穫30日前まで	散布	6回以内	やまのい も
アブラムシ類	トレボン乳剤	イトフェンブ ロックス乳剤	3A		1000倍	100～300%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	やまのい も
ヤマノイモガ	トレボン乳剤	イトフェンブ ロックス乳剤	3A		1000倍	100～300%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	やまのい も