



〔海の状況(10/21~11/20)〕

神子表面水温……期間の前半は平年並み(平年より±0.5℃)からやや低め(平年より0.5~1℃程度低め)、後半はやや高め(平年より0.5~1℃程度高め)で推移した(図1)。

米ノ表面水温……期間の前半はかなり低め(平年より1~1.5℃程度低め)、後半は平年並で推移した(図2)。




図1 三方町神子地先における表面水温の推移




図2 越前町米ノ地先における表面水温の推移

100m深水温……若狭湾沿岸域から沖合域にかけて17~18℃台の水域が広がっていた。




図3 2004年11月上旬の100m深水温




図4 2003年11月上旬の100m深水温

平成16年度第2回日本海漁況予報

日本海区水産研究所が平成16年度日本海サバ類・マイワシ・ブリ長期漁況予報(平成16年11月~平成17年3月)を発表しましたので、簡単に紹介します。(本予報は水産庁ホームページ(<http://www.jfa.maff.go.jp>)のプレスリリースに掲載されています)

1. さば類(島根県~新潟県)

日本海西部海域では、1歳魚(2003年級)を主体とした漁獲がみられ、来遊資源量は昨年同期並である。中部以北の沿岸海域では、前年並みの来遊となる。

2. マイワシ(島根県~新潟県)

マイワシの来遊は引き続き低調な推移を示し、漁獲は散発的になる。

3. ブリ(兵庫県~新潟県)

0歳魚は前年をやや上回る。1歳魚は前年を上回る。2歳魚以上は前年を上回る。

(松宮由太佳)

〔漁の模様〕

2004年10月の県内の総水揚量は1,295tで、2003年同月を354t上回った。アジ類(2004年;167t, 2003年;73t)、サワラ(475t, 91t)、アカガレイ(41t, 22t)、フグ類(29t, 2t)等は上回ったものの、カタクチイワシ (1t, 17t)、サバ類 (3t, 11t)、ブリ類(72t, 133t)、その他カレイ(59t, 92t)、スルメイカ(35t, 66t)、ソデイカ(15t, 47t)等は下回った。

漁業種類別の状況

定置網 ……カタクチイワシ、ブリ類[ツバス銘柄主体] 等は下回ったものの、サワラが大きく上回ったほか、アジ類、フグ類等も上回り、全体で462t上回った。

底びき網 ……アカガレイ、カマス、タコ類は上回ったものの、その他カレイ類等が下回り、全体で23t下回った。

釣り・他 ……アマダイ等は上回ったものの、ブリ類、マダイ、スルメイカ [船凍イカ主体]、ソデイカ等が下回り、全体で85t下回った。

〔県内主要漁業の10月の漁獲量〕

(調査対象市場：三国・越廼・敦賀・早瀬・小浜の各漁連支所、福井市・越前町・若狭高浜の各漁協)

(単位:kg)

定置網				底びき網(つづき)			
魚種	2004年	2003年	94-03平均	魚種	2004年	2003年	94-03平均
ウルメイワシ	3,046	131	4,882	キス類	17,090	15,078	11,187
カタクチイワシ	530	16,584	44,380	ヤリイカ	3,188	1,116	1,378
アジ類	165,364	71,773	117,137	タコ類	9,063	3,728	5,656
サバ類	2,643	11,441	28,403	アカエビ	46,463	47,604	53,565
カツオ類	14,719	955	41,339	その他エビ	3,707	5,460	9,192
ブリ類	71,638	128,011	189,321	その他	62,723	80,312	90,717
ヒラマサ	1,447	12,719	8,513	合計	293,331	316,744	314,015
シイラ	16,420	17,647	61,356	釣り, 延縄, さし網, その他			
サワラ	474,485	91,006	52,052	魚種	2004年	2003年	94-03平均
マダイ	2,994	2,760	3,790	ブリ類	598	4,952	5,371
スズキ	2,173	1,048	685	ヒラマサ	23	1,411	425
カマス	10,624	18,339	25,894	マダイ	3,293	5,738	4,106
フグ類	28,908	1,567	13,631	キダイ	5,709	5,737	2,644
タチウオ	2,187	145	1,156	アマダイ	8,896	6,097	7,725
アオリイカ	19,140	17,204	22,033	ヒラメ	915	735	1,064
ソデイカ	5,984	5,763	13,897	メバル類	2,562	4,231	1,920
その他	84,767	47,748	81,494	スルメイカ	34,774	65,850	100,918
合計	907,069	444,844	709,961	アオリイカ	3,930	4,397	7,560
				ケンサキイカ	3,025	5,101	3,621
				ソデイカ	8,608	40,986	57,807
				タコ類	4,281	5,885	4,941
				その他	18,324	28,463	55,256
				合計	94,937	179,583	253,358
				底びき網			
魚種	2004年	2003年	94-03平均	総計			
マダイ	5,137	3,606	7,259	2004年	2003年	94-03平均	
キダイ	23,353	32,182	31,522	1,295,336	941,171	1,425,494	
アマダイ	2,653	3,372	5,989				
アカガレイ	41,336	22,192	33,532				
その他カレイ	58,408	91,589	46,240				
カマス	10,966	556	9,139				
アナゴ	9,244	9,949	8,638				

〔近府県の漁模様〕

(10月下旬から11月中旬の漁獲状況……1日1隻または1統あたり。京都府の定置網漁獲量は舞鶴漁連への1日あたりの水揚量。)

石川県 …… 定置網 …… ソウダガツオ810kg、アジ284kg、アオリイカ100kg、フクラギ75kg
 京都府 …… 定置網 …… マアジ22.8t、サワラ6.7t、ブリ(つばす)0.5t、ウマヅラハギ0.4t
 兵庫県 …… 定置網 …… アジ259kg、サワラ71kg、イシダイ24kg、ハマチ17kg、スズキ9kg
 鳥取県 …… まき網 …… マアジ37.1t、マサバ16.3t、ブリ類6.3t、ウルメ3.8t

(松宮 由太佳)