



〔海の状況(7/21~8/20)〕

神子表面水温……期間全体をとおしてはなほだ高め(平年より2.0℃程度高め)の範囲で推移した(図1)。
 米ノ表面水温……期間全体をとおしてかなり高め(平年より1.0~1.5℃程度高め)からはなほだ高め(平年より2.0℃程度高め)の範囲で推移した(図2)。




図1. 若狭町神子地先における表面水温の推移。




図2. 越前町米ノ地先における表面水温の推移。

☆ 100m深水温……若狭湾沿岸域には18℃台(2007年:16℃台)が広がっていた(図3, 4)。☆




図3. 2008年8月上旬の100m深水温。




図4. 2007年8月上旬の100m深水温。

資料: 日本海区水産研究所ホームページ発表の日本海漁場海況速報

大型クラゲの出現状況について

独立行政法人水産総合研究センターより、今年大型クラゲの出現状況と予測が発表されましたのでご紹介します(本発表はホームページ[<http://www.fra.affrc.go.jp/kurage/index.html>]の最新情報の中で公表されています)。

- 現時点では、中国沿岸での大型クラゲの出現量が少ない。
- 韓国沿岸で大型クラゲの出現が確認されているものの、他の海域では出現が確認されていないか、または、密度が極めて低いことから、今年度大型クラゲの日本周辺海域での出現量は少ない可能性が高い。
- 漂流ブイの軌跡等の情報から判断すると、東シナ海から対馬海峡周辺にかけての流況は2006~2008年で顕著な変化がみられない。
- 目視調査で大型クラゲが多少なりとも発見されており、また、韓国沿岸でも出現していることから、引き続き、対馬海峡周辺での詳細な情報収集が必要である。(瀬戸久武)

〔漁の様相〕

2008年7月の県内の総水揚量は1,258tで、2007年同月を134t下回った。ブリ類（2008年；281 t、2007年；148t 以下同じ）、トビウオ（98t, 57t）、スルメイカ（281t, 155t）等は上回ったものの、アジ類（166t, 275t）、サバ類(9t, 17t)、サワラ（80t, 361t）、ケンサキイカ（1t, 13t）、タコ類（27t, 45t）、アカエビ（25t, 38t）等は下回った。

漁業種類別の状況

定置網 ……ブリ類（ツバス銘柄主体）、トビウオ等は上回ったものの、アジ類、サバ類、サワラ、ケンサキイカ等は下回り、全体では前年を228t下回った。

底びき網 ……アカエビ等が下回り、全体では前年を13t下回った。

釣り・他 ……タコ類等は下回ったものの、スルメイカ等が上回り、全体では前年を106t上回った。

〔県内主要漁業の7月の漁獲量〕

(単位：kg)

定置網			
魚種	2008年	2007年	98-07平均
マイワシ	1,079	1,656	1,272
ウルメイワシ	0	259	439
カタクチイワシ	27,708	20,597	54,264
アジ類	165,647	274,318	183,871
サバ類	9,162	16,574	27,575
マグロ類	414	205	1,225
カジキ類	1,902	2,179	4,154
カツオ類	173	11,465	16,326
ブリ類	280,884	146,060	83,725
サワラ	79,544	360,047	93,728
トビウオ	97,616	57,015	73,072
マダイ	13,017	9,551	9,735
クロダイ	506	439	398
スズキ	15,846	6,605	4,762
ヒラメ	808	3,021	1,425
カマス	4,972	10,761	6,673
フグ類	538	1,086	1,464
タチウオ	91	447	486
アナゴ	46	73	129
スルメイカ	683	2,838	1,875
アオリイカ	1,298	393	495
ケンサキイカ	633	7,493	16,289
その他	26,785	24,976	41,655
合計	728,273	956,144	623,327

底びき網			
魚種	2008年	2007年	98-07平均
アカガレイ	32	105	132
その他カレイ	432	376	673
ハタハタ	665	0	420
タコ類	0	15	9
アカエビ	25,039	38,238	40,182

底びき網のつづき			
魚種	2008年	2007年	98-07平均
その他	218	411	905
合計	26,386	39,144	42,320

釣り、延縄、さし網、その他			
魚種	2008年	2007年	98-06平均
アジ類	486	605	2,038
サバ類	10	133	395
ブリ類	445	1,900	1,432
トビウオ	20	27	374
マダイ	3,501	4,316	5,025
キダイ	33	130	30
アマダイ	5,196	6,386	8,426
スズキ	9,816	10,713	8,944
ヒラメ	1,023	2,594	2,155
その他カレイ	3,470	3,573	4,037
カマス	22	246	292
タチウオ	236	884	1,197
アナゴ	920	745	1,774
メバル類	5,807	4,472	3,898
キス類	236	1,007	997
スルメイカ	280,339	152,504	108,440
アオリイカ	550	352	232
ケンサキイカ	27	5,906	16,790
ソデイカ	1	599	96
タコ類	26,187	44,107	42,556
その他エビ	1,568	1,934	2,257
その他	163,330	153,799	149,075
合計	503,223	396,933	360,459

総計	2008年	2007年	98-07平均*
	1,257,881	1,392,222	1,081,926

* まき網による漁獲量を含む。

〔近県の漁様相〕

(7月下旬から8月中旬の漁獲状況……1日1隻または1統あたり。)

石川県 …… 定置網 …… コゾクラ36kg、アジ95kg、トビウオ109kg、サワラ29kg
 兵庫県 …… 定置網 …… アジ188kg、ツバス67kg、スズキ30kg、トビウオ40kg
 鳥取県 …… まき網 …… マアジ22.6t、ブリ類1.1t、カタクチイワシ0.4t

(瀬戸 久武)