

特別版

新型コロナワクチン

福井県からのお知らせ

効果と副反応の両方をご理解の上、接種をご検討ください。

ワクチンの効果

○オミクロン株対応ワクチン(対象:12歳以上)

- ・オミクロン株に対する重症化予防効果や発症予防効果が報告されています。

※オミクロン株の変異株(XBB/XBB1.5系統)に対する発症予防効果も報告されています

○従来型ワクチン(生後6か月~4歳用、5~11歳用)


- ・従来型ワクチンもオミクロン株に対する重症化予防効果や発症予防効果が報告されています。

ワクチンの副反応

<接種後8日間以内に発現した主な副反応>

症状	12歳以上		5~11歳	2~4歳	生後6か月~1歳
	ファイザー	モデルナ	従来型ワクチン 2回目	従来型ワクチン 2回目	従来型ワクチン 2回目
接種部痛み	84.9%	94.9%	71%	31.0%	15.0%
倦怠感	54.2%	72.6%	39%	25.7%	—
頭痛	43.7%	59.0%	28%	4.6%	—
発熱(38℃以上)	12.5%	24.8%	7%	4.9%	7.4%

出典:12歳以上:厚生労働省 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会資料
それ以外: 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会資料



ワクチン接種は強制ではありません。

- ・ご本人の意思(小児・乳幼児の場合は保護者の方の意思)に基づき接種をご判断ください。
- ・周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な対応をすることがないようにお願いします。

詳しくはこちらから
(厚労省Q&A)

オミクロン株対応ワクチン

効果



副反応



小児(5~11歳)

効果



副反応



乳幼児(6か月~4歳)

効果



副反応

