



～消毒方法について～

消毒するもの	使用薬剤など	方法
手指		トイレの後、食事の前、調理の前、外から帰ったとき、おむつ交換後などには、必ず石けんと流水で十分に手洗いをしましょう。タオルの共用は避けましょう。 エタノールや逆性石けんは、ノロウイルスにはあまり効果がありません。
トイレの取っ手、ドアノブ 手の触れたところ	次亜塩素酸ナトリウム (商品名:ハイター、 ブリーチ)	250倍に薄めた液(0.02%)を含ませた紙タオル等で拭く。
吐物 排泄物 便が付着した衣類等		50倍に薄めた液(0.1%)を含ませた紙タオル等で拭く。衣類は、汚物を十分に落とした後、250倍に薄めた液に10分間浸し、水洗いする。(または熱湯消毒する。) 金属を腐食させるため、金属に使用した場合は10分程度たったら水拭きする。
熱湯消毒するとき	熱湯消毒	85°Cで1分以上

消毒液の作り方 (商品濃度5%の場合)

濃度	作り方
50倍液 (商品濃度5%を 0.1%に薄めます)	500mlのペットボトル1本分の水 薬剤キャップ2杯 (ペットボトルのキャップ2杯) (10ml) 
250倍液 (商品濃度5%を 0.02%に薄めます)	500mlのペットボトル5本分の水 (2.5リットル) 薬剤キャップ2杯 (ペットボトルのキャップ2杯) (10ml) 

(拭き取りの方法)

- 紙タオルや、ボロ布等を消毒液に浸し、軽く絞った後、ドアのノブやトイレ等を拭き取ります。霧吹き等での噴霧はしないでください。
- 消毒液で拭き取りする場合は、使い捨て手袋かビニール手袋等を着用してください。ビニール手袋の場合は使用后消毒してください。マスクも着用しましょう。よく換気をしましょう。
- 消毒液は、必ず希釈してから使用してください。誤って飲み込まないように注意してください。
- 拭き取ったものは、ビニール袋に入れ密封して捨てましょう。