

稲作情報 No.7

〔水稻生育〕

水田農業レベルアップ委員会技術普及部会（農業試験場、福井米戦略課、JA中央会、JA経済連、主要農作物振興協会）

連休移植や直播では、多くの圃場で有効茎数に達しています。
6月14日に北陸地方が梅雨入りし、雨や曇りの日が多くなりました。
6月15、16日に福井と大野が、いもち病の感染好適条件になりました。
三国、越廼、勝山、今庄では準好適条件になりました。

〔今後の管理〕

- ・ 目標茎数に達したところは、**中干し**、**溝切り**をしましょう。
強い中干しは、収量・品質が低下するため、避けましょう。
- ・ **葉いもち**の病斑を見つけたら、**治療剤**を施用しましょう。

いもち病の感染好適条件


	三 国	越 廼	福 井	勝 山	大 野	今 庄	敦 賀	美 浜	小 浜
6/15	○	○	●	-	●	○	-	-	-
6/16	-	○	●	○	●	○	-	-	-

●：感染好適条件 ○：準好適条件


中干し開始の茎数

	茎数（本/m ² ）
ハナエチゼン	400
コシヒカリ	350～380
直播コシヒカリ	300
あきさかり	420

○農業試験場の生育



5/2移植 ハナエチゼン



5/20移植 コシヒカリ



5/12播種 直播コシヒカリ

○いもち病発生予測システム（プラスタム）による感染好適条件

- ・ 感染好適条件となるかをアメダスデータ（気温、降水量、風速、日照）から推定
- ・ 感染好適条件*から7日後に初発となり、感染好適条件の連続で多発しやすい
- ・ 山際や風通しの悪いところは予測に関わらず感染好適条件となりやすい

* 感染好適条件

- 気温20～25℃
- 弱い雨や露などで葉が長時間濡れる
- 当日を含めた前5日の平均気温が20～25℃



○週間天気予報（6月17日 7時 福井地方气象台）

日付	今日 17日(金)	明日 18日(土)	明後日 19日(日)	20日(月)	21日(火)	22日(水)	23日(木)
福井県	晴時々曇 	曇時々晴 	曇 	曇一時雨 	曇 	曇 	曇一時雨

○病害虫（いもち病、ニカメイチュウ、紋枯病）







雑草の対策は[こちら](#)

畦畔草刈り実践デー

- 1回目 6月18日（土）、19日（日）
- 2回目 7月2日（土）、3日（日）

リスク低減の考え方は[こちら](#)





品種	ハナエチゼン			コシヒカリ								あきさかり			
	調査場所	試験場	JA坂井農場	現地	試験場		JA坂井農場		現地 (慣行栽培)		現地 (特別栽培)		試験場	JA坂井農場	現地
栽培方法 移植・播種時期	移植 5/2	移植 5/3	移植 4/27	移植 5/20	直播 5/12	移植 5/16	直播 5/6	移植 5/15	直播 5/1	移植 5/16	直播 5/3	移植 5/2	移植 5/16	移植 5/15	
地点数	1	1	9	1	1	1	1	14	2	1	2	1	1	2	
草丈 cm	本年	36.6	38.6	34.4	33.0	28.8	31.8	28.1	31.4	26.7	29.9	33.9	36.1	33.6	30.7
	平年	38.2	41.5	35.4	31.4	28.1	34.7	34.5	34.6	33.6	31.6	34.7	35.9	33.5	35.0
茎数 本/m²	本年	664	530	411	446	306	284	277	279	361	184	315	620	282	276
	平年	594	510	472	356	318	349	443	320	454	218	420	628	369	374
葉齢 枚	本年	8.7	8.6	8.5	7.8	6.3	6.7	5.8	7.2	6.6	5.1	6.7	8.9	7.8	7.5
	平年	9.3	9.1	8.9	7.7	6.6	7.6	7.3	7.4	7.3	6.8	7.1	9.3	7.6	8.4
葉色 葉色板	本年	4.6	4.6	4.5	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.3	4.2	4.7	5.0	4.6
	平年	4.7	5.0	4.7	4.5	4.2	4.5	4.3	4.4	4.4	4.1	4.3	4.9	4.8	4.6