

稲作情報 No.16

ハナエチゼン登熟状況、胴割米発生注意報 発令中

水田農業レベルアップ委員会 技術普及推進部会 [作成: 福井県農業試験場、福井米戦略課、JA福井県中央会]



ハナエチゼンは平年より出穂が早かったことに加え、**高温が続いているため、成熟期は平年より早くなる**見込みです。籾水分は平年より低い状態です。

また、コシヒカリやいちほまれは、出穂期を迎えています。

胴割粒および**未熟粒**の発生が懸念されますので、収穫直前までこまめな間断通水を行い、**適期に収穫**しましょう。
暑い中での作業となりますが、**地域での計画的・効率的な水利用に努め**ましょう

【農業試験場の登熟状況・成熟期予測】

● 登熟状況 5月1日移植 ハナエチゼン



8月4日撮影
5月1日移植ハナエチゼン
籾水分29.4%

● ハナエチゼン成熟期予測 (農試)

移植日 5月1日
出穂期 7月11日
成熟期予測 8月11日

出穂後の積算気温 914℃ (福井米技術対策資料)
福井地方気象台の福井市の観測値と平年値 + 2℃で予測

* 今後の気象条件によって変動する
* 登熟の進み方には地域差がある
* 葉色が薄いところは成熟期が早まりやすい

○ 斑点米カメムシ類の注意報が発令中!

中生以降の
品種は
適期防除を
実施しよう



クモヘリカメムシ



アカスジカスミカ



斑点米カメムシ類による着色粒