

稲作情報 No.17

ハナエチゼン登熟状況、胴割米発生注意報 発令中

水田農業レベルアップ委員会 技術普及推進部会 [作成:福井県農業試験場、福井米戦略課、JA福井県中央会]


ハナエチゼンは平年より出穂が早かったことに加え、**高温**が続いているため、**成熟期**は平年より**早くなる**見込みです。籾水分は、降雨があったため、急激な低下は見られませんが、引き続き平年より低い状態です。今後、天候によっては急激な籾水分の低下が生じるも想定されます。

胴割粒および**未熟粒**の発生が懸念されますので、収穫直前まで**こまめな間断通水**を行い、**適期に収穫**しましょう。暑い中での作業となりますが、**地域での計画的・効率的な水利用に努め**ましょう

【農業試験場の登熟状況・成熟期予測】

● 登熟状況 5月1日移植 ハナエチゼン

籾水分



● ハナエチゼン成熟期予測 (農試)

移植日 5月 1日

出穂期 7月 11日

成熟期予測 8月 11日

出穂後の積算気温 914℃ (福井米技術対策資料)
福井地方気象台の福井市の観測値と平年値 + 2℃で予測

- * 今後の気象条件によって変動する
- * 登熟の進み方には地域差がある
- * **葉色が薄いところは成熟期が早まりやすい**

○ 斑点米カメムシ類の注意報が発令中!

中生以降の
品種は
適期防除を
実施しましょう



クモヘリカメムシ アカスジカスミカメ 斑点米カメムシ類による着色粒