

コシヒカリ登熟状況、胴割米発生注意報 発令中


水田農業レベルアップ委員会 技術普及推進部会 [作成:福井県農業試験場、福井米戦略課、JA福井県中央会]

コシヒカリは平年より出穂が1～2日早かったことに加え、**高温が続いているため、成熟期は平年よりやや早くなる見込み**です。現時点の籾水分は、平年並みですが、今後、天候によっては急激な籾水分の低下が生じることも想定されます。

胴割粒および未熟粒の発生が懸念されますので、収穫直前まで**こまめな間断通水**を行い、**適期に収穫**しましょう。
暑い中での作業となりますが、**地域での計画的・効率的な水利用に努め**ましょう

【農業試験場の登熟状況・成熟期予測】

● 登熟状況 5月20日移植 コシヒカリ



8/29撮影
(5/20移植コシヒカリ)

● コシヒカリ成熟期予測 (農試)

移植日 5月20日
出穂期 8月1日 (平年-1日)
成熟期予測 9月6日

出穂後の積算気温1,020℃ (福井米技術対策資料)
福井地方気象台の福井市観測値の平年値 + 2℃で予測

- * 今後の気象条件によって変動する
- * 登熟の進み方には地域差がある
- * **葉色が薄いとところは成熟期が早まりやすい**

○ 斑点米カメムシ類の注意報が発令中！



クモヘリカメムシ アカスジカメムシ 斑点米カメムシ類による着色粒

斑点米の発生が多い場合は、色彩選別機等による選別を強化する