

畜産

実況

1 平成 27 年度第 3 回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成 27 年 5 月 1 1 日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	BMS (No.)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井	18	2,394	1,156,540	6.9	483.3	58.6	83
	全体	38	2,697	1,249,125	7.2	464.8	57.6	92
雌	福井	7	2,406	1,088,443	6.9	452.4	59.9	86
	全体	12	2,629	1,077,871	7.3	44.7	56.2	83

最高価格は、1,585,348 円、去勢牛(福之国×忠富士×上福)、28.6 カ月齢、A-5(BMSNo10)、枝肉重量 516.4 kg、ロース芯面積 60 cm²であり、宮崎県産であった。枝肉単価は、前回より、去勢で 179 円高く、雌で 197 円高かった。

2 平成 27 年度第 4 回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成 27 年 5 月 2 5 日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	BMS (No.)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井	16	2,392	1,123,452	7.9	469.9	59.4	100
	全体	35	2,637	1,240,890	7.3	471.3	58.7	86
雌	福井	8	2,385	1,051,618	6.6	441.0	62.0	75
	全体	18	2,556	1,082,105	6.3	421.9	55.4	72

最高価格は、1,533,036 円、去勢牛(肥後桜×谷美×北国 7 の 8)、26.0 カ月齢、A-4(BMSNo5)、枝肉重量 530.0 kg、ロース芯面積 60 cm²であり、石川県産であった。枝肉単価は前回より、去勢で 60 円安く、雌で 73 円安かった。

対策

1 飼料作物

今年は、積雪が消える時期が例年より遅かったことに加え、春先の高温により十分な草丈が確保される前に出穂を迎えている。そのため、山間部の採草で収量の確保がむづかしい場合は、2 番草の収穫も念頭に入れる必要がある。

- (1) イタリアンライグラス等寒地型牧草の 1 番草の収穫適期は出穂期なので、刈り遅れにならないように注意する。また、刈り遅れたり、予乾中降雨にあった材料は、栄養価の低下のほか、不良発酵し易いので、糖類や乳酸菌を添加するとともに、密封に十分注意する。
- (2) 2 番草や 3 番草を採草する場合、1 番草や 2 番草収穫後、尿素を 10 アールあたり 10～20 k g 追肥し、再生を促す。
- (3) 梅雨シーズンの湿害を防ぐため、ほ場の排水の確保に努める。排水の悪いほ場には、グリーンミレットなど耐湿性の強い草種を栽培する。
- (4) 暖地型牧草を水田で栽培する場合、肥料が流亡し易いので、基肥を半量にし、残りを播種 1 ヶ月後に分施すると良い。
- (5) 種子の軽い暖地型牧草では播種しやすいコート種子が利用されているが、コート剤により増量されているため、播種量に注意する。ローズグラスの場合、コートしていない種子では 2～3kg/10a が適量であるが、コート種子は 5～6kg/10a 必要である。