

畜産

実況

1 平成 27 年度第 5 回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成 27 年 6 月 8 日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	BMS (No.)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井 全体	17	2,262	1,056,032	6.7	466.7	59.3	82
		33	2,440	1,127,387	6.3	462.2	58.0	76
雌	福井 全体	6	2,237	1,022,832	6.0	457.2	62.5	67
		17	2,541	1,064,229	6.6	420.7	60.8	65

最高価格は、1,521,167 円、去勢牛(北平安×安茂勝×北仁)、29.5 カ月齢、A-4(BMSNo.6)、枝肉重量 546.2 kg、ロース芯面積 60 cm²であり、石川県産であった。枝肉単価は、前回より、去勢で 197 円安く、雌で 15 円安かった。

2 平成 27 年度第 6 回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成 27 年 6 月 22 日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	BMS (No.)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井 全体	15	2,309	1,090,508	8.3	471.5	59.5	100
		29	2,530	1,189,526	7.7	468.4	58.2	86
雌	福井 全体	8	2,254	963,996	7.0	428.9	58.1	88
		19	2,542	1,045,402	7.1	411.4	57.3	84

最高価格は、1,576,921 円、去勢牛(百合茂×金幸×平茂勝)、28.5 カ月齢、A-5(BMSNo.9)、枝肉重量 558.4 kg、ロース芯面積 50 cm²であり、鹿児島県産であった。枝肉単価は前回より、去勢で 90 円高く、雌で 1 円高かった。

対策

1 飼料作物

- (1) 刈り遅れた牧草は、不良発酵し易いので、密封には十分注意する。
- (2) 2 番草や 3 番草を採草する場合、1 番草や 2 番草収穫後、尿素を 10 アールあたり 10～20 kg 追肥し、再生を促す。
- (3) 梅雨シーズンの湿害を防ぐため、ほ場の排水確保に努める。排水の悪いほ場には、グリーンミレットなど耐湿性の強い草種を栽培する。
- (4) 暖地型牧草を水田で栽培する場合、肥料が流亡し易いので、基肥を半量にし、残りを播種 1 ヶ月後に分施すると良い。
- (5) 種子の軽い暖地型牧草では播種しやすいコート種子が利用されているが、コート剤により増量されているため、播種量に注意する。ローズグラスの場合、コートしていない種子では 2～3 kg/10a が適量であるが、コート種子は 5～6 kg/10a 必要である。