

畜産

実況

1 平成 27 年度第 7 回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成 27 年 7 月 6 日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	BMS (No.)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井	20	2,365	1,118,239	7.2	469.4	59.6	90
	全体	40	2,586	1,212,683	7.2	463.9	57.7	90
雌	福井	7	2,166	1,000,877	5.6	455.7	54.1	57
	全体	16	2,512	1,068,201	5.7	425.4	54.3	56

最高価格は、1,768,968 円、去勢牛(勝忠鶴×北仁×福谷福)、30.9 カ月齢、A-4(BMSNo.5)、枝肉重量 622.0 kg、ロース芯面積 80 cm²であり、石川県産であった。枝肉単価は、前回より、去勢で 56 円高く、雌で 30 円安かった。

2 平成 27 年度第 8 回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成 27 年 7 月 20 日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	BMS (No.)	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井	24	2,487	1,121,672	7.1	450.7	56.3	79
	全体	48	2,692	1,231,934	7.0	454.9	56.1	77
雌	福井	10	2,444	1,081,195	6.7	444.1	59.2	100
	全体	20	2,687	1,145,649	6.4	428.2	57.1	85

最高価格は、1,708,237 円、去勢牛(百合茂×美津照×北国 7 の 8)、27.9 カ月齢、A-5(BMSNo.9)、枝肉重量 551.4 kg、ロース芯面積 67 cm²であり、石川県産であった。枝肉単価は前回より、去勢で 106 円高く、雌で 175 円高かった。

対策

1 乳牛

暑熱対策その 2 換気扇は効果的に設置しよう！

(1) 夜間は気温が低くても湿度が高い！！

県内のフリーストール牛舎で、6 月中旬から 8 月中旬まで気温と湿度を測定したところ、日中は気温が高く湿度が低くなり、夜間は気温が低く湿度が高い傾向がみられました。このことは夜間においては牛舎の温度と外気温の差がなく、強制的に換気しなければ、牛舎内の空気がほとんど外気と循環していない状況で湿度が高いままと言えます。こうした状況では、飼料給与後の体温上昇に対応することができないので夜間にも強制的に換気を行いましょう。また、空気の循環が悪いと、牛舎内のアンモニア濃度を低減することができず、乳牛へのストレスとなります。

(2) 牛舎内の空気の流れを知った換気扇の設置を

牛舎内の空気の流れを具体的に知る方法として、線香を利用する方法が簡単です。最初に換気扇を止めた状態で、通路やストールの前、牛房の間などにどのような空気の流れがあるかを確認します。その後換気扇を動かし、牛に対して効果的な送風が得られているか、外気が牛舎内に入っているか、牛舎内の空気が換気されているかを確認することができます。これによって、換気扇の有効な場所や無効な場所を確認します。

(3) 気象条件を考慮した換気扇の設置を！！

牛舎は地域や条件によって風の入ってくる方向などに一定性をもっているところがあります。たとえば夏場は午前中に南風が吹き、午後から北風が吹くなどの気象条件があれば、午後の温度上昇を防ぐために、北風を牛舎に取り入れる換気扇の設置を行うことで効果の高い暑熱対策を行うことができます。牛舎の特色を把握して、換気扇の設置場所を工夫することで、最大限の効果を発揮するように努めましょう。