

野菜

実況…(27年3月20日現在)

1 施設野菜

果菜類

(1) 大玉トマト

福井地区の定植は、早いところで2月28日から始まり3月中旬にかけて行われた。1段果房が開花初期となっている。南越地区では、RW栽培で第3段果房が着果期となっている。他の栽培では、3月中旬から定植開始されている。若狭地区では、2月下旬定植が1段果房開花盛期、2段は果房が開花直前となっている。

(2) ミディトマト

若狭地区の促成長期どり栽培は、19～21段果房が開花中で草勢もやや強くなってきた。2月下旬から糖度も高くなってきた。3月に入りやや着色遅く、小果傾向となっている。

半促成栽培の定植は、福井地区では3月13日から、坂井地区では早いところで3月5日から開始されている。大半の生産者は、3月20日前後から定植開始となっている。

(3) キュウリ

若狭地区は、定植が2月25日から順次行われ3月末まで行われる予定である。早いところで草丈30cmとなっている。福井地区では、3月10日から定植開始となっている。

(4) スイカ

坂井北部丘陵地は、自家育苗が2月23日から接ぎ木が行われ、定植は3月20日頃から開始されている。なお、購入苗は3月21日から苗配布となっている。三里浜砂丘地では、購入苗の配布が3月13日から行われている。越前市白山地区では、3月17日から穂木が播種開始となっている。

(5) メロン

坂井北部丘陵地は、プリンスメロンが3月20日頃から定植開始となっている。アールスメロン、アンデスメロンは3月下旬から定植開始の予定である。マルセイユメロンは3月上旬から鉢上げ開始で、定植は3月20日頃から行われている。三里浜砂丘地のマルセイユメロンは、3月24日に苗配布の予定となっている。南越地区のマルセイユメロンは、3月4日から播種開始されており発芽は良好となっている。

(6) イチゴ

各地区の高設栽培では、2～3番果房が収穫中となっている。

うどんこ病、アブラムシ、ハダニ類が微～少発である。

葉菜類

(1) 軟弱野菜

福井地区のハウレンソウは、12月中旬播種を約80日で収穫中である。

根菜類

(1) ダイコン

三里浜砂丘地では、2月14日から播種開始となっている。

2 露地野菜

果菜類

(1) 一寸ソラマメ

若狭地区は、小浜、上中地区で3月14日からトンネル被覆の除去が始まった。高浜地区では分枝数6～8本、分枝長27～50cmとなっている。坂井地区では、3月10日から融雪後の追肥により生育回復を図っている。

赤色斑点病が一部少発である。

葉菜類

(1) キャベツ

9月中旬定植の越冬キャベツが、福井地区、坂井北部丘陵地で継続収穫中となっている。初夏どりキャベツは、福井地区の生育の早いところで球径3～5cm、坂井北部丘陵地で結球初期となっている。坂井地区の10月下旬定植の水田圃場では、本葉7.5枚となっている。

(2) ブロッコリー

福井地区の越冬どりは、本葉5～5.5枚になっている。初夏どりは育苗中で、福井地区では3月下旬から定植開始予定である。南越地区では、2月16日から播種開始され、現在本葉1～2枚となっている。3月下旬定植の予定である。

(3) ツケナ類

勝山水菜は度重なる降雪等の影響で、福井市内への出荷が昨年より遅れて3月9日から始まった。

(4) ネギ

福井地区の6月上～中旬定植が、積雪の影響により現在収穫中となっている。県内の秋冬どりの播種育苗は順次開始されており、育苗の早いところでは草丈6～8cmになっている。奥越地区の発芽苗配布が、3月13日から行われており現在育苗中である。

(5) タマネギ

福井地区は、2月下旬と3月上旬に追肥を行っている。坂井地区では、3月中旬に2回目の追肥実施、生葉数3.5枚になっている。

(6) ニンニク

福井地区は、3月上旬に追肥を行っている。

根菜類

(1) ニンジン

三里浜砂丘地は、3月中旬から播種開始となっている。

(2) ダイコン

三里浜砂丘地は、3月9日から播種開始となっている。

対 策

4月は気温の変動が大きいので、施設野菜の温度管理やトンネルの換気に十分留意する。

また、晩霜や春先の強風や突風も野菜の生育に被害を及ぼすことが多いので注意する。

病害虫関係では、トマト黄化葉巻病予防対策を十分に施すこと。特に、媒介虫であるタバココナジラミの侵入防止と発生回避のため、健苗を定植することや定植時の薬剤施用、初期発生時のローテーション防除によりハウス内にタバココナジラミを入れない、増やさない等の対策を徹底すること。

水田を活用して野菜を作付する場合は、耕起前に天候や圃場条件の良い日を見計らって作付予定地の額縁排水や弾丸暗渠などの排水対策を十分に施工しておくこと。

1 施設野菜

果菜類

(1) トマト

追肥の開始時期は、3段果房開花期頃になるが草勢をみながら追肥の時期と量を決める。なお、草勢が強すぎる場合はかん水だけを行い追肥は数日遅らせる。ただし、追肥を省略するとその後の草勢低下が大きくなり上段の着果が悪くなるので注意する。

3段果房開花期以降の追肥として液肥を用いる場合は、各段の果房開花毎に窒素成分1～2kg/10a程度かん水を兼ねて施用する。ただし、多量の追肥を一度に行うとスジグサレ果等の発生を助長するので注意する。

マルハナバチを導入して交配着果を行う場合は、夜間が極端な低温となると花粉の発現が悪くなるので、最低気温が12℃を下回らないように施設内の保温や加温により夜温を確保する。また、ハチは高温には弱いので、ハウス内気温25℃を目安とし晴天日には日中のハウス換気にも注意を払う。なお、マルハナバチの導入後も、バイトマークが確認できなければ、必要に応じて着果促進のためのホルモン処理を行う。

着果数は、1～2段果房は3～4果、3段果房以上は4～5果を目安にし、奇形果や変形果等を幼果のうちに摘除して草勢の維持と良質果の確保に努める。

(2) ミディトマト

5葉より下に着いた果房は摘除する。また、2本整枝とする場合は、主枝と一番下の果房直下から発生した強い腋芽を伸ばして仕立てる。なお、2本整枝の生育に差が見られる場合は、生育の早い枝をやや倒して、茎頂部の高さを揃える。着果促進のためホルモン処理を行うが、奇形葉の発生を防ぐためホルモン剤が周囲の葉にかからないように注意する。

(3) キュウリ

主枝6～7節位までの雌花と、4節までの側枝を早めに摘除して初期生育を促す。なお、草勢が弱い場合には主枝8～9節位までの雌花を摘除して、着果による負担を軽減する。

主枝の着果数は10本程度を目安とし、ダブル着果で主枝の着果数が多くなりすぎる場合は、草勢低下を防ぐために1果を摘除する。主枝は20～22節程度で摘心する。また、側枝は1～2節で摘心する。

外気温が10℃以上になる頃までは内張カーテンを利用し、午後早めにハウスを閉めて最低気温12℃程度を目標に保温に努める。しかし、夜温が極端に高すぎると初期収量は多くなるものの、草勢低下が大きくなり、中段での側枝の発生が悪くなって総収量を低下させるので注意する。

追肥は収穫開始と同時に始め、その後は400～500kg/10a程度を収穫する毎に窒素成分で1～

1. 5 kg/10a 程度を追肥する。

(4) スイカ

大玉生産に必要な着果節位まで生育量を確保するため、ハウスを早めに閉めてハウス内の保温に努める。なお、トンネルは霜害防止のため、晩霜の心配が無くなる4月中旬頃まで被覆する。2本整枝の場合は、子づる3～4本が30～40cmに伸びた頃に揃った子づる2本を残して他の子づるを摘除する。また、子づるが1m程度に伸びたら、孫づるを摘除しながらつる先を揃えるように子づるを引き戻す。さらに、子づるの先端部18～20節位に雌花が確認できるようになった頃（開花1週間程度前）に、着果節位までの孫づるを摘除する。なお、草勢が弱い場合は、やや早めに孫づるの摘除を行い、開花までに草勢を回復させておく。

(5) メロン

ア プリンスメロン

生育の揃った主枝3本を残し、孫づるを5節まで早めに摘除しておくが、草勢が弱い場合は6～7節まで孫づるを摘除して着果節位を上げ、着果させる孫づるは開花前に2葉を残して摘心しておく。かん水は、根群の発達を促すため晴天日の早朝に行って地温を回復させ、夜間低地温にならないようにする。また、開花後は果実肥大を促進するため、やや多めに灌水する。

イ アールス系メロン

定植時の地温確保のため、定植2～3日前にかん水して地温を回復させておき、定植時には早朝地温を測定して18℃以上であることを確認する。

定植後は日中25～30℃を目安に換気を行うとともに、夜間の保温を徹底する。

ウ マルセイユメロン

最低地温16℃以上を目安に、定植後も暖かい日が続く日を選んで植える。本葉2.5～3枚が展開する頃が定植適期である。本葉3枚を残して早めに摘心する。

(6) 高設イチゴ

温度の上昇に伴い、開花から収穫までの期間が短くなり糖度が低下しやすい時期となるので、ハウス内の換気を十分に行う。また、アブラムシ・ハダニ、うどんこ病の発生が多くなるので、初期防除の徹底を図る。

葉菜類

(1) 軟弱野菜（ホウレンソウ、コマツナ）

温度の上昇とともに葉が伸びやすく収穫適期幅が短くなるので、収穫遅れや品質低下を防ぐため収穫作業労力を考慮して播種面積を決め計画的に播種するとともに、播種密度をやや低くする。

ホウレンソウは、べと病予防のため抵抗性品種を用いる。また、かん水を控えてハウスの換気を行うとともに、防除薬剤の予防散布を行う。

2 露地野菜

果菜類

(1) スイカ、メロン、ナス

スイカ、メロンは4月上中旬、ナスは4月下旬以降に定植時期になる。活着を良好にするためにも、定植遅れや初期生育遅れとならないように、圃場準備は早めに行いマルチやトンネルを設置して地温を高めておく。定植は、必ず晴天日の午前中に行い、定植かん水後、速やかにトンネルを閉じて保温

に努める。なお、苗は定植1週間前から徐々に外気に馴らしおく。

(2) 一寸ソラマメ

土壤水分を確保するとともに、草勢を見ながら追肥を行ない、莢の肥大を促す。

葉菜類

(1) 春キャベツ

結球始期に追肥、中耕を行って結球の肥大を促進する。追肥が遅れると裂球の原因になり、圃場の乾燥は心腐れ症の原因となるので注意する。

(2) ネギ

水田圃場に定植する場合、圃場内の排水対策を万全に施しておく。定植後のネギの活着率を高めるため、耕起作業はできるだけ圃場が乾いている時に、土塊率（2cm以下の占める割合）70%以上になるように丁寧に行う。ひっぱりくんを使用して定植する場合、高さや定植深度を調整して置く。苗は垂直になるように、またペーパーポットが隠れる程度に覆土されるようにゆっくりと植える。

倒れた苗や覆土不足の部分を手直しする。

根菜類

(1) ダイコン

発芽促進や抽台防止のため、播種までに十分地温を確保するため圃場準備を早めに行う。また、播種後好天が続くことが予想される日を選んで播種する。

トンネルは、生育前半は抽台防止のために密閉するが、トンネル内部の水滴の付着が悪いと葉焼けを発生しやすいので、適宜かん水を行う。換気をする場合、急激に行うと葉が著しく萎れて葉焼けを発生させるので徐々にトンネルの換気穴を多くしたり、裾の開度を大きくする。

(2) タマネギ、ニンニク

タマネギ、ニンニクは、球の肥大が始まる4月中旬頃までには追肥を終了しておく。遅い追肥は、葉を過繁茂にして病害等の発生を多くするとともに、貯蔵性を悪くするので行わない。

4月からさび病の発生が見られるようになるので、早期防除を徹底する。