

## 令和3年3月の現況と4月の対策（果樹）

### 実況

2月の日照時間は115.3時間で平年（85.4時間）比135%と多かった。降雨日数は19日で平年（20.5日/月）よりわずかに少なかったが、降水量は201.5mmで平年（169.7mm）比119%とやや多かった。最高気温極値は20.4℃（22日）、最低気温極値は-2.1℃（18日）であった。平均気温は5.4℃と平年比+2.0℃と高かった。15日から17日は最大瞬間風速15m/s以上の強風が吹き、最も強い風は15日の19.8 m/sであった。

3月の日照時間は174.1時間で平年（129.9時間）比134%と多かった。降水量は162.0mmで平年（156.8mm）よりわずかに多かった。最高気温極値は22.2℃（29日）、最低気温極値は-0.2℃（9日）であった。月平均気温は9.8℃で平年比+3.0℃とかなり高かった。最大瞬間風速15m/s以上の強風は1日・2日・20日・27日・28日の5日間記録された。[以上、福井地方気象台のデータによる]

### 1 ウメ

#### (1) 生育状況（園芸研究センター）

「紅サシ」の開花始期は2月15日で、平年より10日早く、前年より10日遅かった（表1）。開花盛期（80%開花した日）は3月3日で平年より9日早く、前年より12日遅かった。完全花率は67.9%であり、平年、前年よりやや低い。

表1 紅サシの年度別開花状況

年度	開花期（月/日）			開花日数 （日）	完全花率 （%）
	始期	盛期	終期		
2021	2/15	3/3	3/17	32	67.9
2020	2/5	2/19	3/4	28	74.3
2019	2/13	3/4	3/18	35	63.3
2018	3/4	3/15	3/23	20	82.6
2017	2/17	3/13	3/29	42	74.0
平年値（2011-2020）	2/25	3/12	3/23	29	75.7

※開花始期：連続開花した日、盛期：開花率80%、終期：開花率100%

#### (2) 地域状況

「紅サシ」は2月中旬頃から開花が始まり、開花盛期は2月下旬頃、開花終期は3月上旬頃となった。ミツバチの巣箱は3月15日に回収された。

### 2 ナシ

#### (1) 生育状況（農業試験場）

発芽期は「豊水」で3月20日、「幸水」で3月22日となった。他発休眠期に入った2月以降の気温が高く推移したことにより花芽の発育が早く進み、開花始期は「豊水」で4月3日（前年より4日、平年より10日早い）、「幸水」で4月5日（前年より5日、平年より10日早い）となった。

#### (2) 地域状況

坂井地区では、3月17日頃に発芽期となった。

**【参考】ナシの発芽期**

新梢先端部の葉芽について調査し、葉芽の先端部が緑に見える芽が、樹全体の20～30%になった日



### 3 カキ

(1) 生育状況（農業試験場）

「刀根早生」、「平核無」とも3月20日に発芽期、4月1日に展葉期となった。

(2) 地域状況

坂井地区の「平核無」は、3月19日頃に発芽期となった。

**【参考】カキの発芽期**

結果母枝先端部の芽のリン片がゆるみ、緑色の部分が見え始める日



### 4 イチジク

(1) 地域状況

3月下旬からハウスの保温を開始している。

### 5 ブドウ

(1) 生育状況（農業試験場）

露地では、樹液の流動が見られている（3月16日現在）。

(2) 地域状況

ハウスの保温は、3月中～下旬に開始されている。

## 対 策

### 1 共通技術

#### (1) 除草・草刈り

草生栽培では、雑草との養水分競合により樹体や果実の生育を抑制する可能性がある。特に4月は、各樹種ともに、展葉・新梢伸長開始・開花結実など多くの養水分を必要とするスタートダッシュの時期である。早春からいち早く繁茂している雑草が養水分を吸収してしまうので、草丈が短いうちにこまめに刈り取る。エコファーマー制度では、有機物の還元による地力向上が求められているので、この点からも雑草の刈取りに積極的に取り組む。

なお、栽培面積が大きい場合、草刈り作業が追いつかない場合は、除草剤の使用を検討する。ただし、除草剤に依存すると、表土の流亡や地力低下などの悪影響が懸念されるので、1年間に2回程度の使用にとどめ、堆きゅう肥などの有機物を補給して地力低下を防ぐ。

### 2 ウメ

#### (1) 病虫害防除

4月は黒星病・アブラムシ類を主体とした展葉初期の基幹防除を適期に行う。

着果期間中のかいよう病には、マイコシールド(水和剤)で対応する。発生予防に用いる場合は、果実横径が10～15mmに肥大した頃が本剤の散布適期である。雹・霰が降った場合は、降雹(霰)から2日以内に本剤を散布する。

ウメシロカイガラムシ第1世代幼虫のふ化時期の早晚は、早春季の気温によって前後する。4月20日頃から越冬成虫(カイガラ)が付着している樹で産卵～ふ化の状況を観察し、ふ化初めからふ化最盛期にアプロードフロアブル等を用いて防除を行う。

#### (2) 「剣先」の摘果

「剣先」は、出荷時期が例年6月前半に限定されるので、6月上旬にLサイズ以上の果実を得るため、4月中下旬から摘果を行う。十分な結実量を確認してから摘果作業を開始し、連休終了までに摘果を終える。

摘果の基準は、10cm以下の短果枝では5cmにつき1果、10cm以上の結果枝では10cmに1果の割合で残し、病虫害やキズのある果実、小さい果実を優先して摘果する。1つの側枝の中では先端部の結果枝に着生した果実、1つの短果枝の中では先端部に着生した果実で大玉になる素質がある。明らかに小さな果実やキズ果を除き、先端部の果実を優先して残す。

### 3 ナシ

#### (1) 摘らい・摘花

大きい果実をつくるには、細胞の数を多くすることが重要である。開花から開花後1か月頃までは、果実の細胞数が増える時期である。摘らいや早期の一次摘果によって、前年から樹に蓄えられた貯蔵養分を今年収穫する果実に集中させる。開花から収穫までの期間が短い「幸水」では、摘らいが特に重要であり、優先して行う。

摘らいは作業可能な期間が短い、道具を使わないので効率よく作業できる。果台の向きが横～斜め上向きのものを、1花そうに3～5花残すようにする。摘らいが十分できなかった場合は、開花中に摘花を行い、摘らいを補完する。なお、良品生産のための花そう数は、目標着果数の2倍程度である。多

すぎると養分の浪費となり、少なすぎると摘果時に良果を選抜しにくくなる。

主枝や亜主枝の先端部・予備枝の先端・側枝先端2芽までの部分は、旺盛な新梢伸長が必要なので、葉を傷つけないように気をつけて、すべての蕾・花を摘み取る。

## (2) 人工授粉

自然に飛んでくる訪花昆虫にまかせた授粉は結実が安定せず、着果数不足になる可能性があるため、人工授粉やミツバチの放飼を積極的に行う。摘らい・摘花した場合は、人工授粉によって確実に着果させる。

人工授粉の準備として、開花直前の花蕾を集め、葯を採取して、気温25℃・湿度30～50%の状態を開葯させ、フルイにかけて花粉を集める。また、花粉収集の手間や開葯器等がない場合は、輸入花粉を購入・利用してもよい。

花粉は石松子で5倍に増量し、梵(ぼん)天・筆・綿棒などにつけて柱頭の先端をたたくように授粉する。花粉は15℃から発芽し、めしべ柱頭の粘液も気温が高いほど多くなるので、暖かい日に授粉を行うのがよい。限られた花粉なので、すべての花に授粉するのではなくて、側枝を真向かいに見て、水平からやや上向きの1～2花に授粉する。

## (3) 芽かき

芽かきの目的は、徒長枝伸長による養分の浪費を抑え、養分を主枝や側枝の先端までスムーズに流れるようにし、樹冠部の受光体勢を良好にすることにある。主枝・亜主枝・側枝基部の上面や更新した側枝の切り口付近の不定芽から発生する新梢は、徒長枝になりやすいので芽かきする。主枝・亜主枝の先端が花芽で切り返してある場合は、2本の新梢が発生することがあるので、芽かきして1本にする。

## (4) 病虫害防除

開花前の気温(15～20℃)は黒星病菌が増加しやすく、前年の落ち葉からの越冬菌飛散、枝での越冬菌増加時期でもある。さらに、開花期前後は黒星病の感受性が高く重要な防除時期となる。黒星病および黒斑病は、りん片脱落期から満開期に降雨が続くと多発しやすいので、使用基準を守って薬剤防除を徹底する。

# 4 カキ

## (1) 晩霜対策

4月は移動性高気圧と低気圧が本州付近を交互に通過し、天候が周期的に変化しやすい。曇雨天で日中の気温が上がらず、夜になって空が澄みわたり底冷えする場合は、霜害の危険性が高まる。

この時期は戸外に温度計を常時設置しておき、気象庁から霜注意報が発表されたら気温を測定する。午後8時の外気温が5℃以下の場合、翌朝は降霜する可能性が高いので注意し、気温が0℃近くまで下がってきたらスプリンクラー散水を実施する。

## (2) 病虫害防除

展葉初めに当たる4月下旬からカキクダアザミウマなどの害虫が活動し始める。カキ・マツ・スギ等の樹皮下で越冬していたカキクダアザミウマの成虫が新梢に飛来し、未展開葉を加害する。4月下旬にオルトラン水和剤等で防除する。

# 5 イチジク

## (1) 敷わらとかん水・排水対策

イチジクは乾燥に弱いので、敷わらをするとともに適宜かん水する。ハウス栽培の場合、保温開始

頃から発芽までの期間の土壌水分を高めを保つと、発芽揃いがよくなる。また、過湿にも弱いので、圃場内に滞水しないよう排水対策を行う。

## (2)ハウス管理

発芽期以降もハウス内が40℃以上の高温になると障害が発生するため、日中は25～30℃を目安に天窓やハウスサイドを開けて過度の温度上昇を防止する。また、適宜、かん水して乾燥を避ける。

## 6 ブドウ

### (1)芽かき

発芽に合わせて徐々に芽かき作業を開始する。短梢せん定栽培では、新梢数が主枝片側20～30cm間隔になるようにする。1回目の芽かきは、展葉2～3枚の時に不定芽と副芽をかき取る。2回目の芽かきは、展葉6～8枚の時に極端に強い新梢あるいは弱い新梢をかく。その後も新梢数が多ければ随時芽かきする。

### (2)ハウス管理

発芽期以降もハウス内が40℃以上の高温になると障害が発生するため、日中は25～30℃を目安に天窓やハウスサイドを開けて過度の温度上昇を防止する。また、土壌の乾燥を避け、数日おきにかん水する。

