

オオタマツリスゲ

Carex filipes Franch. et Sav. var. *rouyana* (Franch.) Kük.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は2箇所であり、いずれの生育地でも個体数が少ないので、県域絶滅危惧Ⅰ類とした。

分 布

本州（東北地方南部～近畿地方）に分布。県内では嶺北地方で確認されている。

種の特徴

暖温帯に生育。葉は粉緑色で前年の葉は枯れて残らない。基部の鞘は淡褐色。

生育を脅かす要因

林道拡幅等の環境改変。森林伐採。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
												○	○				

ウマスゲ

Carex idzuroei Franch. et Sav.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は1箇所、個体数も減少傾向であるため県域絶滅危惧Ⅰ類とした。

分 布

本州（関東地方以西）～九州に分布。県内では嶺北地方で確認されている。

種の特徴

湿地に生える多年草。有花茎は高さ40～60cm。葉幅は4～8mm、小穂は離れてつき、苞の葉身は小穂よりも長い。

生育を脅かす要因

生育地の乾燥化

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○										○						

キンチャクスゲ

Carex mertensii Presc. var. *urostachys* (Franch.) Kük.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は1箇所、個体数も少ないので県域絶滅危惧Ⅰ類とした。

分 布

北海道、本州（東北地方、中部地方）に分布。県内では大野市で確認されている。

種の特徴

高山の草地に生える多年草。有花茎は高さ30～50cm。側小穂は雌雄性であり、基部の鞘の色は淡褐色である。

生育を脅かす要因

気候変動に伴う生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	