

ヒメクワガタ

Veronica nipponica Makino ex Furumi
オオバコ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

奥越の亜高山帯にのみ生育する。

分 布

中部地方の日本海側～東北地方に分布し、県内では奥越の亜高山帯で見られる。

種の特徴

高山の草地に生える多年草。茎は直立して高さ7～14 cm、白毛がまばらにある。葉は対生して無柄、卵状楕円形で両面に白毛がある。花期は7～8月、茎の先に淡紅紫色の花を数個つける。

生育を脅かす要因

産地局限、登山者による踏圧。

参考文献 福井県植物研究会（2001）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市	
																	○	

エチゴトラノオ

Veronica ovata Nakai subsp. *maritima* (Nakai) Albach
オオバコ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地が越前海岸の一部に限られる。

分 布

東北地方～北陸地方の日本海側に分布し、県内では越前町、福井市に見られる。

種の特徴

海岸の草地に生える多年草。茎は高さ50～100 cm。葉は対生し、狭卵形、表面につやがある。花期は8～9月。茎の先端に伸びる10～20 cmの総状花序に青紫色の花をつける。

生育を脅かす要因

産地局限、園芸採取、海岸開発。

参考文献 福井県植物研究会（1998）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
							○										○

カワチシャ

Veronica undulata Wall.
オオバコ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：県域準絶滅危惧

【環境省カテゴリー】準絶滅危惧

選定理由

生育環境が限られ、個体数も少ない。オオカワチシャ（特定外来生物）の侵入による遺伝子汚染の恐れもある。

分 布

本州（中部地方以西）～琉球に分布し、県内一円で広く確認例がある。

種の特徴

川岸等の湿地に生える一年草～越年草。茎は高さ10～50 cmで直立～斜上する。葉は対生し、披針形～長楕円状披針形。花期は5～6月。葉腋から花序を出し、淡紅紫色の花を15～50個つける。

生育を脅かす要因

河川敷や湿地の開発、オオカワチシャの侵入による遺伝子汚染。

参考文献 福井県植物研究会（1998）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○			○	○				○					○	○	○