

イトテンツキ

Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. *capitata* (Miq.) Ohwi
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】準絶滅危惧

選定理由

既知の生育地は1箇所である。情報が不足しているため、要注目とした。

分 布

本州(福島県以西)から九州に分布。福井市で確認されている。

種の特徴

日当たりの良い草地に生える一年草。小穂は頭状に集まり、鱗片は濃褐色、先は芒とならず反曲しない。

生育を脅かす要因

土地造成。道路の舗装。除草剤の散布。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市	
																		○

マツバスゲ

Carex biwensis Franch.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は9箇所あるが、圃場整備や用水路の改修で生育環境が狭められているので、要注目とした。

分 布

北海道～九州に分布。嶺北、嶺南で確認されている。

種の特徴

低地の湿地に生える多年草。小穂は1個を頂生し、上部の雄花部は雌花部と同長または少し長い。小穂は他のハリスゲよりも長い。

生育を脅かす要因

湿地開発。水路改修。土地造成。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
						○							○		○		

チャシバスゲ

Carex caryophyllea Latour. var. *microtricha* (Franch.) Kük.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は3箇所、どの生育地も個体数が少ないこと、情報も不足しているため、要注目とした。

分 布

北海道～本州(中部地方以北)に分布。県内では嶺北、嶺南で確認されている。

種の特徴

山地や河川敷の草地に生える多年草。長い匍枝を伸ばし疎生する。葉は有花茎より短く、雌小穂の鱗片は褐色で、果胞が大きい。

生育を脅かす要因

自然遷移。大規模な河川改修。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
		○								○						○	