

# ホザキノフサモ

*Myriophyllum spicatum* L.  
アリノトウグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

河川等の生育環境の消失や水質悪化などにより減少傾向にあるので、要注目とした。

## 分 布

北海道～九州に分布する。県内では小浜市、若狭町、あわら市、永平寺町、坂井市、福井市、勝山市で確認されている。

## 種の特徴

池や沼に生える多年草。茎は細く伸びて、枝をわけ、長さ30～150 cm。水中にある葉は輪生し、4個、卵形、柄はなく、羽状に深裂。花期は5～10月。頂生する穂状花序は水面より突き出て直立し、上部に雄花、下部に雌花を付ける。果実は4分果で、分果は長楕円形。

## 生育を脅かす要因

池沼開発、河川開発、水質汚濁。

## 参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○				○					○	○		○		○		○

# モメンツル

*Astragalus reflexistipulus* Miq.  
マメ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

昭和8年発行の福井県植物目録に吉田郡吉野（現永平寺町）で採集された記録があるが、その後は確認されていない。

## 分 布

北海道～本州に分布。県内では永平寺町で記録がある。

## 種の特徴

山麓の草地に生える多年草。茎は這って上部は斜上する。小葉は長卵形～長楕円形、長さ2～5 cm。花期は6～8月。長さ2～3 cmの花序に黄色の花を8～15個つける。

## 生育を脅かす要因

管理放棄、遷移進行。

## 参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
										○							

# ニワフジ

*Indigofera decora* Lindl.  
マメ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

県内のあちこちで採集記録があるが、個体数は少ない。

## 分 布

本州（中部、近畿地方以北）～九州に分布し、県内一円で記録がある。

## 種の特徴

山地の川岸の岩場に生える低木で高さ60 cmほどになる。葉は9～13枚の小葉からなる。花期は5～6月。長さ10～20 cmの総状花序に紅紫色の花が密につく。

## 生育を脅かす要因

園芸用の採取。

## 参考文献

福井県植物研究会（1999）、福井県樹木誌（2011）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
					○		○			○		○		○		○	○