

# 南越稲作情報 No7

## — 今年も胴割米・茶米の発生に注意! —

南越農林総合事務所 農業経営支援部

本年も、梅雨が長く、7月の日射量が少ないため、ハナエチゼン、コシヒカリとも、根量が少ない状態です。また、8/1以降は高温に推移し、昨年以上に、胴割米、茶米、乳白米の発生が懸念されます。今後の水管理、収穫、乾燥に注意し、品質向上に努めましょう。

### 1 登熟期間の水管理・・・間断通水の徹底を！

登熟期の水管理が不十分だと、胴割米、茶米、乳白米の発生を助長しますので、収穫2～5日前までの間断通水を徹底しましょう。

※ 品質向上に向け、仕上げの時期に入りました。収穫まで、適切に管理しましょう。

### 2 収穫・・・刈り遅れに注意！

刈り遅れは胴割米、茶米の発生を助長します。収穫予想日が近づいたら、水田ごとに穂を観察し、青籾の割合が10%（籾水分25%）となったら収穫を始めましょう。

※ 中干し不良の水田は、他の水田より収穫始期が2日程度早まる可能性があります！

※ 農林総合事務所では、8/20以降、コシヒカリについて籾水分調査を実施し、収穫始期予想値の補正を行います（下表参照）。今後の情報に注意下さい。

### 3 斑点米カメムシの防除・・・コシヒカリについて

1回目：穂が出揃った頃 + 2回目：1回目の7日後 に薬剤散布する。

※ 時期を逃すと効果が小さくなります。また、畦畔を含めて防除しましょう。

※ 斑点米多発地域では、1回目にスタークル粒剤を散布する。

※ 休耕田が未耕耘、未防除の場合は、早急に“休耕田に登録のある殺虫剤（トレボン粉DL、Mr ジョーカー粉DL など）”を散布。 ⤷ 本田防除の直前に実施すること！

表 出穂期と収穫日予想

品種	移植・播種日	平 坦		中山間		
		出穂期	収穫始期(予想)	出穂期	収穫始期(予想)	
ハナエチゼン	移植	5/1	7/22	8/24	7/23	8/26
コシヒカリ	移植	5/4	8/1(7/28)	9/6(8/27)	—	—
		5/13	8/9 (8/6)	9/15 (9/5)	8/9 (8/6)	9/19 (9/8)
	直播	5/1	8/11 (8/4)	9/17 (9/5)	8/12 (8/4)	9/23 (9/9)

( ) 内は昨年。

収穫始期は、気象により変化します（早まる可能性があります）。今後の情報に注意してください。