

南越稲作情報 No9

— 胴割注意報発令！刈遅れや乾燥に注意！ —

（コシヒカリ、イクヒカリで胴割米の発生が予想されます。）

南越農林総合事務所 農業経営支援部

今年も、胴割注意報が発令されました。“刈遅れ”、“乾燥の失敗”は胴割米発生につながります。下記のことを守って、米品質の仕上げを行いましょう。

1 コシヒカリの刈取り開始予想

	5/3 移植	5/13 移植	5/3 直播
刈り取り開始日 (予想)	9/4	9/10	9/12

※ 中干しが不十分な水田、登熟期の入水不足の水田では、刈取り開始日が上記より2～3日程度早まる可能性があります。

※ 8/27現在の籾水分

・ 5/3 移植のコシヒカリ 約30%

・ 5/13 移植のコシヒカリ 約35%

(籾水分が25%になった時が刈取り開始日です)

※ イクヒカリの場合は、コシヒカリと移植・播種日が同じなら、コシヒカリの2～3日前が刈り取り開始日です。

※ 上記開始日から2日以内に収穫しましょう。

2 乾燥

高温乾燥、急激な乾燥は避けましょう。2段乾燥すれば、胴割米発生はより軽減されます(水分18%になったら一時乾燥を中止し、6時間後に仕上げ乾燥を行う方法)

- 適期に収穫が終了しないと予想される場合は、刈取り開始日の前より収穫を始め、1回の乾燥における張り込み量を減らすことで、胴割米の発生が軽減されます。
- 収穫3～5日前までの間断通水の徹底を！
 - ・ フェーン時は確実に深水管理を実施しましょう(稲が吸水しやすくなります)