

南越稲作情報 No10

— コシヒカリ、イクヒカリで胴割米が発生！ —

— 刈遅れ や 乾燥 に注意！ —

南越農林総合事務所 農業経営支援部

“刈遅れ”、“乾燥”に注意して、米品質の仕上げを行いましょ。

1 コシヒカリの刈取り開始予想

	5/13 移植	5/3 直播
刈取り開始予想日	9/12	

※ 中干しが不十分な水田、登熟期の入水不足の水田では、刈取り開始日が上記より2～3日程度早まる可能性があります。

※ 特にイクヒカリは、刈遅れに注意しましょ。

※高温年の収穫適期は短いので、穂の状態を確認しながら（上位枝梗の先端の籾の胴割れの有無など）、できるだけ早く収穫すること。

2 乾燥

乾燥作業が原因で胴割れしたと思われる被害も出ています。

高温乾燥、急激な乾燥は避けましょ。

- ・ 2段乾燥で、胴割米発生はより軽減。
(水分18%以下となった時点で乾燥を一時中止し、6時間後に仕上げ乾燥を行う)
- ・ 低温で乾燥することで、胴割米発生はより軽減。
(張り込みダイヤルを実際の張り込み量より低く設定)

○ 今年は、開穎籾が発生。開穎籾がある場合は、胴割米が発生しやすく、乾燥は低温で（40℃以下）！

○ 刈遅れが懸念される場合は、刈取り開始日の前より収穫を始め、低温で乾燥する。

- 水管理は
 - ・ 収穫3～5日前までの間断通水の徹底を！
 - ・ フェーン時は必ず“深水”にしましょ。
(稲が吸水しやすくなります)

