

湛水土壌中直播（条播）コシヒカリ栽培暦

時期	生育相	作業項目	作業内容	必要資材 10a 当り
4/初 4/上	胚活動開始	圃場準備	春耕起 圃場を均平にする。	
		浸種	7～10日間 最初の3日間は停滞水に置き、後は2日に1度水の交換を行う。	
4/中		代かき	芽はハト胸程度。 均平に努め、完了後深水にしておく。 （播種2～3日前）	
4/下		カルバ-コーティング 加温処理	コーティング後陰干しする。 30、24時間育苗機で加温する。 （播種2日前）	カルバ- 16 1倍量 チカレ-ス粉 3% アトマイザ-水 100g
	発芽直前	落水	夕方落水 （播種前日）	
5/初	1.0葉	播種 施肥	特に低い所がある場合、溝切りを行う。 播種後4～5日間落水状態として出芽を促進し、その後浅水状態とする。 施肥同時播種	2.5kg(乾物重) 直播名人 35~40kg (1ムコト直播 30~35kg)
5/下		除草剤散布	播種後10日 に入水後散布する。 5日間湛水状態	イネガード 1kg
		除草剤散布	落水後浅水状態 深水にしない 播種後20日 に入水後散布する。 5日間湛水状態	リポルバ- 1kg
		3.0葉		
6/初	5.0葉	除草剤散布	ヒエが目立つ場合に散布 入水後散布する。 （播種後40日）	クインチャー- 1kg剤 1kg
6/中	最高分けつ期	溝切、中干し	3～5m間隔	
6/下		病害防除	葉いもち病防除	オリブライト粒 1kg
7/中		幼穂形成期		
7/下		病虫害防除	穂いもち、紋枯、コメカ、ウカ、ヨコバネ、カメシ、コメカ	混合粉剤 4kg
		倒伏軽減剤散布	出穂15～10日前湛水散布 （倒伏懸念の場合）	スプレット粒 3kg
8/上	出穂期 穂揃期	病虫害防除	穂いもち、紋枯、コメカ、ウカ、ヨコバネ、カメシ	混合粉剤 4kg
9/中	成熟期	落水 収穫	収穫10～7日前	